**Sortie Laguiole 06-08-2023**
**Un sentier de découverte sur l'Aubrac**

GPS: 44.67375 3.91503 à 1300 m et 44.68312 3.92623 à 1285 m

Compte Rendu Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistants : Jean Claude Saintleger, Martine Bernard, Geneviève Boulot, Sophie Lemonnier, David & Mary Dickenson, Marie-Felice Vilette, Christiane Duchamp, Marc Boboeuf




**La liste des plantes se trouve à la fin du compte-rendu**

**HABITATS PRINCIPALS ÉXPLORÉS :**

**Correspondance avec les codes sur EUNIS sur https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf**

**Codes Corines :**

**1) Corine : 37.81 Mégaphorbaies des montagnes formées à l'ère primaire**

**2) Corine : 54.422 Bas marais acides subatlantiques à laîche noire, laîche courte et laîche en étoile**

David Dickenson david@naturescene.co.uk

Les Barmy Botanists adorent l'Aubrac, un paysage tellement différent aux Causses-Cévennes. Cette fois, Christiane et Marc ont fait les trouvailles qu'ils ont voulu partager avec les autres Barmies, et nous ont persuadé quitter notre chère Lozère pour l'Aveyron. C'est vrai, la Lozère était que 4 km au sud-est, et le Cantal encore plus proche à 1 km. Notre intérêt était les tourbières autour la Vergne Noire, à l'est de Laguiole, facilité par plusieurs sentiers de découverte.

Déjà un site Nature 2000, l'année 2014 a vu la création de **la réserve biologique dirigée de la Vergne Noire** avec « les objectifs principaux sont la conservation d'une tourbière remarquable, la conservation d'une population de Ligulaire de Sibérie (*Ligularia sibirica*), le développement de la naturalité d'habitats forestiers, la conservation de la flore et de la faune associées à ces divers milieux typiques de la région naturelle de l'Aubrac ». Et comment c'est un grand réussit !

Notre première étape était un parking en face d'une belle station des **ligulaire de Sibérie (*Ligularia sibirica*)**. Cette plante protégée liste rouge est un reliquaire de la dernière ère de glace. Les Barmies connaissent très bien une autre station sur l'Aubrac (lac de Souveyrols), mais l'accès est difficile par une tourbière et la barbelée ; en plus, le cadre ici était magnifique, avec la forêt et les éclaircies sur un sol trempé.

**La ligulaire de Sibérie (*Ligularia sibirica*)**

La plante était également contente de l'ombre des résineux et un amphithéâtre ensoleillé, à condition que ses pieds fussent dans l'eau. Avec ses feuilles gigantesques et les inflorescences faisant les épis d'or, notre groupe des Barmies était très admiratif.

**Le jonc diffus (*Juncus effusus)***

Avec les pieds dans l'eau, on a noté **le jonc diffus (*Juncus effusus).*** Le jonc se différentie du jonc aggloméré (*Juncus conglomeratus*) par la « bractée ».

En effet, cette partie au-dessus l'inflorescence est en réalité une feuille caulinaire ; les stries sont moins nombreuses et peu marquées, et pas dilatée à sa base.

Il y avait une autre espèce à tige unique avec les pieds dans l'eau. Avec les feuilles très poilues, elle s'agit de **la luzule blanc-de-neige (*Luzula nivea)***. Malheureusement, les fleurs d'un beau blanc sont devenues très sales, une caractéristique de cette espèce.

**La luzule blanc-de-neige (*Luzula nivea)***

**Le galéopsis tétrahit (*Galeopsis tetrahit)***

Le terrain était un mélange des flaques et des monticules, et côte à côte se trouvaient les plantes des tourbières et les pâturages. Sur le 'sec' se trouvait un galéopsis qui est brut en comparaison avec les galéopsis qu'on a vu il y a 15 jours dans les Gorges du Bramont (voir www.naturescene.net/barmies/Bramont_7-2023.pdf).

*Galeopsis ladanum* et *Galeopsis segetum* étaient toute féminin, mais cette espèce était plus grande, plus rigide, à tiges hérissées de longs poils raides, piquants et renflées aux nœuds. Il s'agit **du galéopsis tétrahit (*Galeopsis tetrahit)***.

Aussi présent, avec les pétales le même couleur, était **la bétoine (*Betonica officinalis)***, qui se trouve souvent sur les pâturages de Mont Lozère.

La forme des feuilles est un peu particulier ; noter bien, parce-ce que ça fait une forme de référence, comme Liseron à feuilles de bétoine (*Convolvulus betonicus*) et Raiponce à feuilles de bétoine (*Phyteuma betonicifolium).*



**La bétoine (*Betonica officinalis)***

Après on a pris peut-être une mille photos, on est monté un petit chemin pour prospecter la lisière d'un bois assez sec, et pour faire sécher les bottes.

**Le mélampyre des près**
***Melampyrum pratensis***

Il y avait une ressemblance forte avec la flore de notre sortie autour la baraque de Pompeyrenc sur la Margeride (voir www.naturescene.net/barmies/Pompeyrenc_7-2022.pdf) l'année précédente, y inclus **le mélampyre des prés (*Melampyrum pratense)*** et **la prêle des bois (*Equisetum sylvaticum).***

**La prêle des bois**
***Equisetum sylvaticum***



**Le jonc grêle (*Juncus tenuis)***
**fleur**

Au bord du chemin, de moins intérêt, sauf pour l'auteur, se trouvait **le jonc grêle (*Juncus tenuis)***.

Courant chez lui dans la New Forest, Angleterre, il ne vois pas ni les fleurs ni les fruits quand il passe ses jours en hiver.

**Le jonc grêle (*Juncus tenuis)***
**fruit**

De retour, on a fait notre pique-nique jusqu'avant le parking. On était intrigué par des fleurs blanches et roses en abondance qui couvraient un buisson. En les regardant tout près, il s'agit du **compagnon rouge *(Silene dioica)***.

Normalement les pétales sont un rose vif ; c'était une forme d'hypochromie, quelque chose anormalement courant cette année parmi beaucoup des espèces. Peut-être à cause des dégâts d'un printemps pluvieux ? Noter les pétales déformées sur le rose.

**Le compagnon rouge**
***(Silene dioica)***

**Le compagnon rouge**
***(Silene dioica)***
**couleur normale,**
**Mt. Lozère**

Pour dessert, on a fini notre pique-nique avec les framboises sauvages autour le parking, et on a avancé un demi-kilomètre sur la route pour prendre un sentier de découverte. Jean Claude Saintleger et l'auteur étaient privilégiés à faire une journée avec deux botanistes expertes sur les tourbières d'Aubrac une semaine auparavant. Ils s'impatientaient à renforcer leur savoir de cet écosystème exceptionnel, avec des différences importantes de Mont Lozère.

Mais la chose inattendue pour tout le monde était la richesse et abondance de la faune ; les amphibiens, les insectes, les arachnides. Les éclaircies aux bords du chemin et les tourbières bourdonnaient partout.

**Le criquet des clarières (*Chrysochraon dispar*)**

**La grenouille (*Rana temporaria*)**



**L'opilion de belle taille (*Odiellus troguloides*) ?**

**Le criquet ensanglanté (*Stetophyma grossum*)**

**La decticelle des bruyères (*Metrioptera brachyptera* )**

On a trouvé un groupe assez important des plantes, par leur odeur évidement des scrofulaires, mais lequel ? Toutes en fruit, les feuilles étaient ravagées par deux espèces de chenilles, **la cucullie des scrofulaires** (***Cucullia scrophulariae)*** et un peu mal placée, **la cucillie de la molène *(Cucullia verbasci*).** Les entomologistes peuvent me corriger ! La dernière est courante plutôt sur les molènes, qu'ils peuvent démolir en quelques jours.

On avait du mal de l'identifier comme **la scrofulaire à oreillettes (*Scrophularia auriculata)*** parce que les chenilles avaient mangé la plupart des oreillettes des feuilles, ce qui est d'une importance primordiale pour confirmer.

**La scrofulaire à (ou sans) oreillettes (*Scrophularia auriculata)***

Pour des vivaces du chemin, la taille des fleurs de **la violette des Vosges (*Viola lutea*)** faisaient un fort contraste avec tous les autres purpurine-violet-pourpre-mauve-lilas-rose (je laisse le lecteur décider ; pour les Anglais, c'est tout simplement « purple »).

**La centaurée jacée (*Centaurea jacea subsp. jacea)***

**La centaurée noir (*Centaurea nigra)***

**La violette des Vosges (*Viola lutea*)**

Pour renforcer notre éducation de la dernière sortie (voir www.naturescene.net/barmies/Bramont_7-2023.pdf), deux centaurées poussaient ensemble, **la centaurée jacée (*Centaurea jacea subsp. jacea),*** avec les fleurs rayonnante à l'extérieure de l'inflorescence, et **la centaurée noir (*Centaurea nigra)*** sans fleurs rayonnante. Je laisse aux lecteurs de rappeler/observer les différences des bractées.



**Le cirse des champs (*Cirsium arvense*)**

**Le cirse aranéeux (*Cirsium eriophorum*)**

**Le cirse commun (*Cirsium vulgare* subsp. *vulgare*)**

Souvent il a fallu écarter les insectes pour identifier la plante, et ils étaient de retour avant qu'on peut faire cliquer l'obturateur pour faire une photo.

On a reconnu **le cirse des champs (*Cirsium arvense*)** par son parfum fort ; le deuxième cirse, **le cirse aranéeux (*Cirsium eriophorum*)** par ses involucres ronds et aranéeux ; et **le cirse commun (*Cirsium vulgare* subsp. *vulgare*)** par ces bractées involucrales externes étalées et ses feuilles à petites épines apprimées (en plus des épines fortes).



On a déjà rencontré **le jonc diffus (*Juncus effusus)*** et **le jonc grêle (*Juncus tenuis)*** le matin, mais 4-5 autres espèces de jonc se sont présentées l'après-midi, la plupart sur le terrain humide avec une tendance à dessécher pendant l'été. (Quelques photos d'ailleurs)

**Le jonc rude**
**(*Juncus squarrosus)***

**Le jonc à fleurs aigues**
**(*Juncus acutiflorus)***

**Le jonc des crapauds**
**(*Juncus bufonius)***

**Le jonc filiforme**
**(*Juncus filiformis)***

**Le jonc des Barmies**
**(*Juncus christianus)***

Partageante le même habitat des joncs, **la luzule à inflorescences denses (*Luzula congesta).*** Cette plante était plus difficile à identifier que normal ; fin de saison, elle avait que quelques poils sur la tige, ce qui dit « luzule, pas jonc » ; elle manquait les poils autour l'inflorescence qu'on a noté sur Mont Lozère.

**La luzule à inflorescences denses**
**(*Luzula congesta)***

**aujourd'hui**

**4 semaines en avance, 2019**

La fin 2022 a vu la sortie de « Guide Expert des Carex de France », et il y avait les enthousiastes parmi nous à fortifier notre connaissance de cet groupe tellement difficile. Donc c'était avec impatience qu'on a attendu ce moment et on n'était pas déçu. Sur notre droite (marqué « * » sur la carte) se trouvait une tourbière forte intéressante, avec les panneaux d'interprétation.



**La laiche pauciflore (*Carex pauciflora)***

Le plus rare s'agit de **la laiche pauciflore (*Carex pauciflora)***, difficile à voir à cause de sa taille minuscule. Néanmoins, c'est facile d'identifier, les fruits pauciflores en forme du logo de Mercedes.



**La laîche vert jaunâtre (*Carex demissa)***

**La laîche vert jaunâtre (*Carex demissa)*** est l'inverse ; d'une taille moyenne, assez courant sur les zones humides siliceuses, avec ses couleurs vifs **.**



**La laiche des lièvres (*Carex leporina)***

**La laiche des lièvres (*Carex leporina)***, avec l'inflorescence en zig-zag characteristique, les épillets rapprochés. On l'a déjà trouvé sur une sortie sur Mont Lozère (voir www.naturescene.net/barmies/Finiels_7-2019.pdf).

**La laiche bleuâtre (*Carex panicea)***, bien nommée par les Anglais « carnation sedge » à cause des feuilles bleuâtres.

**La laiche bleuâtre (*Carex panicea)***

**La laiche à utricules renflés (*Carex versicaria*)**

Finalement, **la laiche à utricules renflés (*Carex versicaria*)** ; une grosse plante avec une souche rampante, elle formait les colonies importantes avec le jonc rude au bord le chemin. C'est facile à confondre avec la laiche à ampoules (*Carex rostrata)* ; c'est ce qu'on a fait ce jour. Si la bractée basale, relativement courte, n'est pas visible, comme la photo, regard les fruits. Les utricules sont piriformes (comme un poire) et subdressés, pas horizontales.

Il y avait quelques autres espèces bien visibles, mais il faut du temps, une bonne loupe, une copie de 'Carex de France', de la patience et de l'expertise pour toute noter. Jamais se contenter avec une photo pour faire l'identification ; souvent un échantillon suffit, mais parfois il faut observer plusieurs plantes pour les espèces variables.



Finalement, pour cette tourbière, il y avait beaucoup des plantes de **l'andromède (*Andromeda polifolia)***. C'est une plante liste rouge protégée, très rare, d'une hauteur pas plus de 12 cm hauteur ici, à feuilles de romarin. Pour la deuxième fois en quelques jours, l'auteur l'a vu, avec les boutons et les fruits. Mais trouver les fleurs ? Absolument impossible !

**L'andromède (*Andromeda polifolia)***



Fruits

Eventuellement, l'auteur a conclu que les boutons colorés étaient les boutons des feuilles, et c'était déjà trop tard pour voir les fleurs en cloche typique de sa famille des Ericaceae.

En mars 2024, l'auteur a finalement trouvé les fleurs—en Angleterre !

**La menthe des champs (*Mentha arvensis).***

On a quitté cette tourbière pour avancer à une autre tourbière, plus petite, avec un caractère plus intime, entouré par le bois. Je n'ai jamais vu une tourbière bleue comme ça. Moins engorgée de l'eau, c'était couverte par une forme lilas foncé de **la menthe des champs (*Mentha arvensis).***

En Lozère, l'inflorescence est soit blanchâtre, soit bleu pale, comme on a vu autour les ligulaires ce matin. Elle se différentie de *Mentha aquatica* par le manque d'une inflorescence terminale, épanouissant de bas en haut.



Finalement, aux marges de la tourbière, d'un bleu vif, les fleurs **de la gentiane des marais (*Gentiana pneumonanthe)***. Les Barmies ont déjà vu des œufs de l'azuré de la croisette (*Phengaris rebeli*) sur la *Gentiana cruciata* (voir www.naturescene.net/barmies/

**La gentiane des marais (*Gentiana pneumonanthe)*.**

Avec diligence, tout le monde a cherché les œufs d'un papillon très proche, l'azuré des mouillères (*Phengaris alcon*). Et oui, sur quelques pétales et sépales, on a trouvé les œufs de ce papillon liste rouge. Les feuilles font la nourriture obligatoire de la chenille, avant qu'ils fussent mener par les fourmis pour passer 7-8 mois dans leurs fourmilières.

C'était la fin de notre journée enrichissant. Un peu hors de notre région habituelle, on a déterminé à prospecter en plus de profondeur cette région à l'avenir.

**Station Ligularias, matin**

| LatinTaxRef | Francais | English |
|---|---|---|
| Angelica sylvestris L. | Angélique des bois | Angelica, Wild |
| Arnica montana L. | Arnica des montagnes | Arnica |
| Artemisia vulgaris L. | Armoise commune | Mugwort |
| **Betonica officinalis L.** | **Bétoine** | **Betony** |
| Calluna vulgaris (L.) Hull | Bruyère commune | Heather, Ling |
| Centaurea nigra L. | Centaurée noir | Knapweed, Common |
| Cirsium palustre (L.) Scop. | Cirse des marais | Thistle, Marsh |
| Ziziphora acinos | Thym basilic | Basil-thyme |
| Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Orchis maculé | Orchid, Heath Spotted |
| Daphne mezereum L. | Daphné bois-gentil | Mezereon |
| Digitalis purpurea L. | Digitale pourpre (f.) | Foxglove |
| Epilobium palustre L. | Epilobe des marais | Willow-herb, Marsh |
| Fragaria vesca L. | Fraisier des bois | Strawberry, Wild |
| **Galeopsis tetrahit L.** | **Galéopsis tétrahit** | **Hemp-Nettle, Common** |
| Galium uliginosum L. | Gaillet des tourbières | Bedstraw, Fen |
| Genista tinctoria L. | Genêt des teinturiers | Greenweed, Dyer's |
| Gentiana pneumonanthe L. | Gentiane des marais | Gentian, Marsh |
| Gnaphalium sylvaticum L. | Gnaphale des bois | Cudweed, Wood |
| Hieracium virgultorum Jord. | Epervière,(virgultorum) | Hawkweed,(virgultorum) |
| **Juncus effusus L.** | **Jonc diffus** | **Rush, Soft** |
| Lactuca muralis (L.) Gaertn. | Laitue des murs | Lettuce, Wall |
| **Ligularia sibirica (L.) Cass.** | **Ligulaire de Sibérie** | **Ligularia** |
| Linaria repens (L.) Mill. | Linaire rayée | Toadflax, Pale |
| Lotus pedunculatus Cav. | Lotier pédonculé | Bird's-foot trefoil, Greater |
| **Luzula nivea (Nathh.) DC.** | **Luzule blanc-de-neige** | **Woodrush, Snowy** |
| Malva moschata L. | Mauve musquée | Mallow, Musk |
| **Melampyrum pratense L.** | **Mélampyre des prés** | **Cow-wheat, Common** |
| **Mentha arvensis L.** | **Menthe des champs** | **Mint, Corn** |
| Picea abies (L.) H.Karst. | Epicéa commun (Sapin rouge) | Spruce, Norway (Xmas |
| Potentilla erecta (L.) Räusch. | Potentille dressée | Tormentil |
| Prunella hastifolia Brot. | Brunelle à feuilles hastées | Self-Heal, Spear-leafed |
| Prunella vulgaris L. | Brunelle commune | Self-Heal, Common |
| Ranunculus flammula L. | Renoncule flammette | Spearwort, Lesser |
| Rubus idaeus L. | Framboisier | Raspberry |
| Rumex obtusifolius L. | Patience à feuilles obtuses | Dock, Broad-leaved |
| Silene latifolia Poir. | Silène blanc, Compagnon blanc | Campion, White |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. | Silène enflé | Campion, Bladder |
| Stachys sylvatica L. | Epiaire des bois | Woundwort, Wood |
| Succisa pratensis Moench | Succise-des-prés | Scabious, Devils-bit |
| Trifolium pratense var. pratense L. | Trèfle des prés | Clover, Red |
| Trifolium repens L. var. repens | Trèfle blanc | Clover, White |
| Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | Speedwell, Thyme-leaved |

La Vergne Noire, l'aptès-midi

| LatinTaxRef | Francais | English |
|---|---|---|
| Alchemilla xanthochlora Rothm. | Alchémille jaune vert | Lady's Mantle, [Yellow-green] |
| **Andromeda polifolia L.** | **Andromède (f.)** | **Andromeda, Marsh** |
| Aria edulis (Willd.) M.Roem | Alisier | Whitebeam |
| **Betonica officinalis L.** | **Bétoine** | **Betony** |
| Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | Campanule à feuilles rondes | Harebell |
| **Carex demissa Vahl ex Hartm.** | **Laîche vert jaunâtre** | **Sedge, Common Yellow** |
| **Carex leporina L.** | **Laiche des lièvres** | **Sedge, Common Hare** |
| **Carex panicea L.** | **Laiche bleuâtre** | **Sedge, Carnation** |
| **Carex pauciflora Lightf.** | **Laiche pauciflore** | **Sedge, Few-flowered** |
| **Carex vesicaria L.** | **Laiche à utricules renflés** | **Sedge, Bladder** |
| **Centaurea jacea L. subsp. jacea** | **Centaurée jacée** | **Knapweed, Brown-rayed** |
| **Centaurea nigra L.** | **Centaurée noir** | **Knapweed, Common** |
| **Cirsium arvense (L.) Scop.** | **Cirse des champs** | **Thistle, Creeping** |
| **Cirsium eriophorum (L.) Scop.** | **Cirse aranéeux** | **Thistle, Woolly** |
| **Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare** | **Cirse commun** | **Thistle, Spear** |
| Crataegus monogyna Jacq. | Aubépine | Hawthorn, Single-styled |
| Dianthus armeria L. | Oeillet (m.) arméria | Pink, Deptford |
| Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus (P.Fourn.) Jauzein | Oeillet des bois | Pink, Woodland |
| Digitalis purpurea L. | Digitale pourpre (f.) | Foxglove |
| Drosera rotundifolia L. | Rossolis à feuilles rondes | Sundew, Round-leaved |
| Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. | Angélique des Pyrénées | Angelica, Pyrrenean |
| Equisetum arvense L. | Prêle des champs | Horesetail |
| **Equisetum sylvaticum L.** | **Prêle des bois** | **Horsetail, Wood** |
| Fragaria vesca L. | Fraisier des bois | Strawberry, Wild |
| **Galeopsis tetrahit L.** | **Galéopsis tétrahit** | **Hemp-Nettle, Common** |
| Genista anglica L. | Genêt anglais | Greenweed, English |
| **Gentiana pneumonanthe L.** | **Gentiane des marais** | **Gentian, Marsh** |
| Geranium pyrenaicum Burm.f. | Géranium des Pyrénées | Cranesbill, Hedgerow |
| Gnaphalium sylvaticum L. | Gnaphale des bois | Cudweed, Wood |
| Gnaphalium uliginosum L. | Gnaphale des marais | Cudweed, Marsh |
| Hieracium virgultorum Jord. | Epervière,(virgultorum) | Hawkweed,(virgultorum) |
| Hypochaeris radicata L. | Porcelle | Cat's-ear |
| Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Pelser & | Séneçon à feuilles d'Adonis | Ragwort, Adonis leaved |
| Jacobaea vulgaris Gaertn. | Séneçon Jacobée | Ragwort |
| Jasione laevis Lam. | Jasione pérenne | Sheepsbit, (Perennial) |
| **Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.** | **Jonc à fleurs aigues** | **Rush, Sharp-flowered** |
| **Juncus bufonius L.** | **Jonc des crapauds** | **Rush, Toad** |
| **Juncus effusus L.** | **Jonc diffus** | **Rush, Soft** |
| **Juncus filiformis L.** | **Jonc filiforme** | **Rush, Thread** |
| **Juncus squarrosus L.** | **Jonc rude** | **Rush, Heath** |
| **Juncus tenuis Willd.** | **Jonc grêle** | **Rush, Slender** |
| Lactuca muralis (L.) Gaertn. | Laitue des murs | Lettuce, Wall |
| Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek | Lapsane commune | Nipplewort, Perennial |
| Linaria repens (L.) Mill. | Linaire rayée | Toadflax, Pale |

La Vergne Noire, l'aptès-midi

| LatinTaxRef | Francais | English |
|---|---|---|
| **Luzula congesta (Thuill.) Lej.** | **Luzule à inflorescences denses** | **Woodrush, Densely-flowered** |
| Matricaria discoidea DC. | Matricaire odorante | Mayweed, Rayless, Pineapple weed |
| **Mentha arvensis L.** | **Menthe des champs** | **Mint, Corn** |
| Meum athamanticum Jacq. | Fenouil des Alpes | Spignel, Baldmoney |
| Monotropa hypopitys L. | Monotrope suce-pin | Bird's-nest, Yellow |
| Paris quadrifolia L. | Parisette | Herb Paris, True Love-knot |
| Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre | Renouée à feuilles de patience | Persicaria, Pale |
| Persicaria maculosa Gray | Renouée persicaire, Pied rouge | Persicaria |
| Phleum pratense L. | Fléole des prés | Timothy |
| Picea abies (L.) H.Karst. | Epicéa commun (Sapin rouge) | Spruce, Norway (Xmas |
| Populus tremula L. | Tremble | Aspen |
| Prenanthes purpurea L. | Prénanthes pourpre | Lettuce, Purple |
| Prunella hastifolia Brot. | Brunelle à feuilles hastées | Self-Heal, Spear-leafed |
| Rubus idaeus L. | Framboisier | Raspberry |
| Rumex crispus L. | Rumex crépu | Dock, Curled |
| Rumex obtusifolius L. | Patience à feuilles obtuses | Dock, Broad-leaved |
| Scabiosa columbaria L. | Scabieuse columbaire | Scabious, Small |
| **Scrophularia auriculata L.** | **Scrofulaire à oreillettes** | **Figwort, Water** |
| Scrophularia nodosa L. | Scrofulaire noueuse | Figwort, Common |
| Senecio ovatus subsp. alpestris (Gaudin) Herborg | Séneçon de Fuchs | Ragwort, of Fuchs |
| Silene dioica (L.) Clairv. | Compagnon rouge | Campion, Red |
| Solidago virgaurea L. | Verge d'or | Golden-Rod |
| Stellaria alsine Grimm | Stellaire alsine | Stitchwort, Bog |
| Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Scirpe cespiteux | Deer Grass |
| Trifolium pratense var. pratense L. | Trèfle des prés | Clover, Red |
| Trifolium repens L. var. repens | Trèfle blanc | Clover, White |
| Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (J.C.Mikan ex Pohl) Celak. | Valériane à feuilles de sureau | Valerian, (Elder-leaved) |
| Verbascum thapsus L. | Bouillon blanc | Mullein, Aaron's Rod |
| Veronica scutellata L. | Veronique à écussons | Speedwell, Marsh |
| Vicia cracca L. | Vesce à épis | Vetch, Tufted |
| **Viola lutea Huds.** | **Violette des Vosges** | **Pansy, Mountain** |