


Sortie Le Pompidou 26-05-2024

Lozère : Entre le Pompidou et le Col de Tartabisac

GPS: 44.20194 3.64804 à 775 m

Compte Rendu Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistants : Barbara Tixier, David & Mary Dickenson, Catherine Pernel, Raymond Gras, Valentine Aumont, Mary & Alan Cranston, Elspeth Cranston



La liste des plantes se trouve à la fin du compte rendu

HABITATS PRINCIPALS EXPLORÉS :

Correspondance avec les codes sur EUNIS sur https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf

Codes Corines :

- 1) Corine : 87.2 Zones rudérales
- 2) Corine : 38.23 Prairies de fauche submontagnardes
- 3) Corine : 22.34 Suintements temporaires sur silice

David Dickenson david@naturescene.co.uk

Le Pompidou est un village aux deux faces. Situé en Lozère, mais 2 kms du Gard, on se trouve entre le climat méditerranéen et le climat continental, avec la ligne des partages des eaux 2 kms au nord-ouest. On est entre un plateau calcaire et une vallée cévenole schisteuse.

Les Barmy Botanistes ont voulu prospecter une petite route qui traverse ce terrain, en toutes ses complexités.




Le Pompidou : la descente vers les vallées cévenoles

L'auteur veut commencer avec une confession. Au parking, autour d'un poste télégraphique, il y avait un groupe de petites plantes blanches, avec des têtes pendantes sur de longs pédoncules. Sachant une station de la **moenchie dressée (*Moenchia erecta*)** que quelques kilomètres d'ici, il a voulu retrouver cette espèce très rare.

Mais non, en effet il s'agissait du **lin purgatif (*Linum catharticum*)**, une plante beaucoup plus courante, et se trouvant partout cette année. En regardant ses photos, il a vu que les pétales étaient beaucoup plus longs et arrondis, et les sépales manquaient les bords scariés caractéristiques de *Moenchia erecta*.

Le lin purgatif
(*Linum catharticum*)



La moenchie dressée
(*Moenchia erecta*)

Un début raté, mais le reste de la journée passée mieux. La route passait entre les pâturages, avec une végétation riche et variée, sur un sol plutôt siliceux mais arrosé par le calcaire.



L'herbe était déjà assez haute, mais il restait toujours pas mal des annuelles, avec 4 espèces de géranium :
 le **géranium colombin** (*Geranium columbinum*) à feuilles très découpées ;
 le **géranium luisant** (*Geranium lucidum*) à feuilles luisantes ;
 le **géranium des Pyrénées** (*Geranium pyrenaicum*) aux pétales plus purpurines, moins roses ;

et le **géranium à feuilles rondes** (*Geranium rotundifolium*) avec ses feuilles ... rondes ; mais pas toujours, un peu variable. Mais cette espèce est couverte de poils abondants, étalés, de taille variable et souvent visqueuse, toute sur la même tige.



Le géranium colombin
(*Geranium columbinum*)



Le géranium luisant
(*Geranium lucidum*)



Le géranium des Pyrénées
(*Geranium pyrenaicum*)



Le géranium à feuilles rondes
(*Geranium rotundifolium*)



Une seule plante de la **rorippe des Pyrénées** (*Rorippa pyrenaica*) s'est présentée avec un éclat de jaune. Cette espèce à parfum de miel était rare il y a 20 ans, mais maintenant elle est de plus en plus commune.


La rorippe des Pyrénées (*Rorippa pyrenaica*)

Le printemps, il y a 20 ans, l'auteur a vu les gros boutons d'un bulbe, et il a attendu avec patience l'éclosion. Six mois plus tard, le **colchique d'automne** (*Colchicum autumnale*) a fleuri.

Comme aujourd'hui, c'était les fruits qu'il regardait. les fruits restent sous terre pendant l'hiver, et sortent pour être admiré par les botanistes amateur en printemps.



Le colchique d'automne (*Colchicum autumnale*)



Un colchique en automne 2023





La fleur-de-coucou (*Lychnis flos-cuculi*).

Il y avait les endroits très humides, des plantes avec leur pieds dans l'eau, avec une belle station de la **fleur-de-coucou** (*Lychnis flos-cuculi*).



La dactylorhize de mai (*Dactylorhiza majalis*)

Également content, le **dactylorhize de mai** (*Dactylorhiza majalis*) aux fleurs pourpre vif étaient bien visible par la hauteur de sa hampe. L'autre nom, le **dactylorhize à larges feuilles** est aussi propice.



Le **lotier-pois** (*Lotus maritimus*), toujours avec ses pieds dans l'eau, est témoin que cette eau est descendue de la Can de l'Hospitalet, un petit cause calcaire. Le lotier-pois est une plante pionnière de la marne (une argile de calcaire). Le nom anglais 'dragon's teeth' dit tout.

Le lotier-pois (*Lotus maritimus*)





Tout près des fleurs-de-coucou (mais trop inaccessible pour prendre une bonne photo), sur terrain plus sec, il y avait deux buissons avec des feuilles qui se ressemblent, le **houx (*Ilex aquifolium*)** et le **chêne vert (*Quercus ilex*)**.

L'auteur retourne en Angleterre chaque hiver, en part pour admirer les belles baies rouges du houx qui couvrent notre forêt (la New Forest), mais ici c'est une plante qui se batte pour survivre, et c'est rare à trouver un buisson aussi fleuri qu'aujourd'hui.

Le houx (*Ilex aquifolium*)



La New Forest fournit Londres à Noël depuis l'arrivée du chemin de fer



Le chêne vert, par contre, est une borne importante pour signaler qu'on a passé côté méditerranée. Il y a des bois entiers de ce chêne qui ornent les vallées cévenoles.

Le chêne vert (*Quercus ilex*)



Le silène blanc (*compagnon blanc*)



Le silène enflé (*Silene vulgaris subsp. vulgaris*)

Les graminées maintenant étaient assez hautes, mais pas suffisant à cacher 4 espèces des silènes vivaces.

Ce n'est pas difficile d'identifier le silène blanc (*compagnon blanc*) (*Silene latifolia*) et le silène enflé (*Silene vulgaris subsp. vulgaris*).

Mais pour différencier entre le silène d'Italie (*Silene italica subsp. italica*) et le silène penché (*Silene nutans subsp. nutans*) c'est plus difficile.

D'abord, il faut une montre. Si c'est avant 10 heures le matin et les fleurs sont ouvertes, il s'agit de *Silene italica*. De même, si c'est après midi et les fleurs sont encore ouvertes, il s'agit de *Silene nutans*.

Entre 10h et 12h, il faut chercher la coronule développée de *Silene italica*. En plus, si les fleurs sont fermées, celles de *Silene italica* sont enroulées en avant, et l'inverse pour *Silene nutans*.



Le silène d'Italie (*Silene italica subsp. italica*)



Le silène penché (*Silene nutans subsp. nutans*)



Les silènes vivaces sont courants, mais sur un rocher schisteux déjà sec, on a tombé sur une silène annuelle rare, le **silène de France** (*Silene gallica*), beaucoup plus petite, souvent un couleur clair et sale.

Le silène de France (*Silene gallica*)

Peu signalé en Lozère, l'**eufragie à larges feuilles** (*Parentucellia latifolia*) se trouve plutôt aux bords de la Méditerranée et de l'Atlantique.

À priori une plante des lieux sablonneux, curieusement les Barmies l'a trouvé aujourd'hui sur ce rocher schisteux, et pendant notre retour, jusqu'en face, au bord de la route parmi une végétation assez dense, sans doute arrosée par les eaux calcaires.

Avec cet air éclectique, pourquoi elle n'était pas beaucoup plus courante ? Peut-être parce elle est toute petite, et se cache.



L'eufragie à larges feuilles (*Parentucellia latifolia*)



Pas loin, la **saponaire de Montpellier** (*Saponaria ocymoides* subsp. *ocymoides*). Très proche des silènes, elle est assez courante sur les rochers au bord de la route, formant les taches de couleur très appréciées.



La saponaire de Montpellier (*Saponaria ocymoides*) sssp. *ocymoides*)

Les orchidées n'étaient pas très abondantes, mais néanmoins, on a noté +/- 14 espèces, y inclus l'**orchis punaise** (*Anacamptis coriophora* subsp. *coriophora*). C'est la seule orchidée d'être protégée partout en France.

Normalement rare, elle se trouve ça et là autour du Pompidou, mais il y a une station des milliers au nord des Barre des Cévennes, 8 km d'ici à vol d'oiseau. Les Barmies les ont vu un peu plus tard – voir www.naturescene.net/barmies/Bramadou_2024.pdf.



L'orchis punaise (*Anacamptis coriophora* subsp. *coriophora*)




Pique-nique des Barmies sur l'herbe
et
pique-nique d'une tique sur un Barmy



On est retourné aux voitures, et a continué sur cette route 1 km après le virage. On a quitté le parking pour trouver un endroit idéal pour une pique-nique.

Pas aussi idéal qu'on a pensé, parce que l'un des Barmies a attiré quelques bestioles affamées, des tiques.



Dans les Cévennes, il n'y a pas un pique-nique sans pélardon, un fromage de chèvre. Le matin, on a remercié ce troupeau qui broutaient le pâturage autour de nous.

Les fournisseurs des pelardons




Le changement de végétation était dramatique ; on était bien dans une vallée cévenole, 100 % schisteuse de haut en bas. Au-dessus d'un banc rocailleux, il y avait un bois de de jeunes arbres, plutôt les chênes sessiles (*Quercus petraea*).

Cette paroi des rochers était presque nue, sauf la bruyère cendrée (*Erica cinerea*). Au moins, jusqu'à l'endroit où on a tombé sur la première plante nettement côté méditerranée. On a pu différencier la ciste à feuilles de sauge (*Cistus salviiifolius*) d'une autre ciste à fleurs blanches de cette région par ses feuilles.

Pour l'autre ciste à fleurs blanches, plus rare, (*Cistus populifolius*), il faut continuer la corniche des Cévennes 10 km plus au sud. La ciste à fleurs roses (*Cistus albidus*) se trouve sur les terrains calcaires de la Méditerranée



La ciste à feuilles de sauge (*Cistus salviiifolius*)





Au-dessus les cistes, sur les hauteurs de la paroi on a vu quelques orobanches aux tiges jaunâtres/bruns. Trop fanées et trop inaccessibles pour voir les stigmates, avec leur grande taille on peut confirmer l'**orobanche du gânet** (*Orobanche rapum-genistae*) avec confiance.

L'orobanche du gânet (*Orobanche rapum-genistae*)



Il y avait pas mal d'une autre espèce d'orobanche au bord de la route. Pour vérifier les orobanches, il faut toujours regarder le couleur des stigmates (violacées dans ce cas), souvent manquant quand on regarde la photo chez soi.

La corolle était un blanc sale teinté de violet, et on peut proposer l'**orobanche du trèfle** (*Orobanche minor*). En regardant la végétation autour ces plantes parasitiques, on a vu leur repas, des trèfles et d'autres Fabaceae, en abondance.

L'orobanche du trèfle (*Orobanche minor*)



Parmi les plusieurs espèces de trèfle qu'on a noté, le **trèfle incarnat sauvage** (*Trifolium incarnatum* var. *molinerii*) était le plus abondant, et si j'ose dire, le plus joli.

Parfois, on a trouvé le **trèfle jaunâtre** (*Trifolium ochroleucon*) ; l'un des plus tardifs des trèfles, c'était le début de floraison, avec son couleur subtil de blanc-jaunâtre.



Le trèfle jaunâtre (*Trifolium ochroleucon*)




Le trèfle incarnat sauvage
(*Trifolium incarnatum* var. *molinerii*)

Les Barmies ont fini leur journée sur un endroit magnifique. Sur quelques virages à angle droit autour les petites routes de Masbonnet, il y a les ravins raides, humides, avec les suintements constants en printemps, protégé du vent, signalé par l'asphodèle-cerise (*Asphodelus cerasifer*).

Parfois à tiges un peu ramifié, pas toujours facile à différencier d'*Asphodelus ramosus* ; mais les fleurs et surtout les fruits sont nettement plus grands.



L'asphodèle-cerise (*Asphodelus cerasifer*)



Et cet habitat est le micro niche préféré du **sérapias à languette (*Serapias lingua*)**. On était très content à trouver quelques pieds ; on ne savait pas que la prochaine sortie on va voir ce sérapias à perte de vue.

voir

www.naturescene.net/barmies/Bramadou_2024.pdf.

Le sérapias à languette (*Serapias lingua*).



L'habitat des suintements temporaire sur silice est rare et très localisé, avec les espèces de haute valeur patrimoniale.

Mais c'était tard : les prospections à refaire une autre fois.

1: Matin Mélange de rudérale, ravins, bords des pâturages humides ; dalles sec, schiste et calcaire cont./...

LatinTaxRef	Français	English
Aira caryophylla L.	Canche caryophyllée	Hair-grass, Silvery
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp. coriophora	Orchis punaise	Orchid, Bug
Anacamptis morio subsp. morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis bouffon	Orchid, Green-winged
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.	Anarrhinum à feuilles de pâquerette	Snapdragon, Blue
Anthoxanthum odoratum L.	Flouve odorante	Sweet vernal grass
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	Cress, Thale
Arctium minus (Hill) Bernh.	Bardane à petites têtes	Burdock, Common
Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp. arenaria	Armérie (f.) des sables	Thrift, Jersey
Asplenium adiantum-nigrum L.	Asplénium noir	Spleenwort, Black
Asplenium ceterach L.	Cétérach officinal	Rustyback
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Doradille du nord	Spleenwort, Forked
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes L.	Capillaire des murailles	Spleenwort, Maiden-hair
Briza media L.	Amourette	Quaking-Grass, Common
Carduus nigrescens subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens	Chardon noircissant	Thistle [blackening]
Colchicum autumnale L.	Colchique d'automne	Autumn Crocus
Dactylorhiza maculata (L.) Soó	Orchis maculé	Orchid, Heath Spotted
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	Dactylorhize de mai	Orchid, Broad-leaved Marsh
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Orchis sureau	Orchid, Elder-flowered
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	Tamier	Bryony, Black
Echium vulgare L.	Vipérine vulgaire	Viper's Bugloss
Erica cinerea L.	Bruyère cendrée	Heather, Bell
Ervilia hirsuta (L.) Opiz	Vesce hérissée	Tare, Hairy
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum	Eupatoire (f.) à feuilles de Chanvre	Hemp Agrimony
Fragaria vesca L.	Fraisier des bois	Strawberry, Wild
Fraxinus excelsior L.	Frêne commun	Ash
Genista pilosa subsp. pilosa (L.)	Genêt poilu	Greenweed, Hairy
Geranium columbinum L.	Géranium colombin	Cranesbill, Long-stalked
Geranium lucidum L.	Géranium luisant	Cranesbill, Shining
Geranium pyrenaicum Burm.f.	Géranium des Pyrénées	Cranesbill, Hedgerow
Geranium rotundifolium L.	Géranium à feuilles rondes	Cranesbill, Round-leaved
Helianthemum nummularium (L.) Mill.	Hélianthème commune	Rock-Rose, Common
Heracleum sibiricum L.	Berce de Sibérie	Hogweed, [Siberian]
Hieracium planchonianum Timb.-Lagr. & Loret	Épervière (de Planchon)	Hawkweed, (of Planchon)
Hippocrepis comosa L.	Fer-a-Cheval	Vetch, Horseshoe
Hylotelephium maximum (L.) Holub	Orpin, Grand	Orpine, (Large)
Ilex aquifolium L.	Houx	Holly
Jasione laevis Lam.	Jasione pérenne	Sheepsbit, Perennial
Knautia arvensis (L.) Coult.	Knautie des champs	Scabious, Field
Linum catharticum L.	Lin purgatif	Flax, Purgative
Logfia minima (Sm.) Dumort.	Cotonnière naine	Cudweed, Slender

.../cont. 1 : Matin Mélange de rudérale, ravins, bords des pâturages humides ; dalles sec, schiste et calcaire

LatinTaxRef	Français	English
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus	Lotier corniculé	Bird's-foot trefoil, Common
Lotus maritimus L.	Lotier-pois	Dragon's teeth
Lychnis flos-cuculi L.	Fleur-de-coucou	Ragged Robin
Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens	Menthe à feuilles rondes	Mint, Apple
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis brûlé	Orchid, Burnt
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.	Grande Listère	Twayblade
Oenanthe peucedanifolia	Oenanthe à feuilles de Peucedan	Dropwort
Onobrychis viciifolia Scop.	Sainfoin	Sainfoin
Ophrys scolopax subsp. scolopax Cav.	Ophrys bécasse	Orchid, Woodcock
Ornithogalum umbellatum L.	Ornithogale	Star-of-Bethlehem
Parentucellia latifolia (L.) Caruel	Eufragie à larges feuilles	Eyebright, Wide-leaved
Plantago lanceolata L.	Herbe à cinq cotes	Plantain, Ribwort
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.	Platanthère (f.) verdâtre	Orchid, Greater Butterfly
Polygala vulgaris L.	Polygala commun	Milkwort, Common
Polypodium vulgare L.	Polypode commun	Polypody, Common
Potentilla argentea L.	Potentille argentée	Cinquefoil, Hoary
Quercus ilex L.	Chêne vert, Yeuse	Oak, Holm
Ranunculus acris L. subsp. acris	Bouton d'or	Buttercup, Meadow
Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	Buttercup, Bulbous
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.	Rorippe des Pyrénées	Yellow-cress, Pyrenean
Rumex acetosella L.	Oseille de brebis	Sheep's Sorrel
Rumex scutatus L.	Oseille ronde	Rubble Dock
Sambucus nigra L.	Sureau	Elder
Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides	Saponaire de Montpellier	Soapwort, Rock
Saxifraga fragosoi Sennen	Saxifrage faux-hypne	Saxifrage, Mossy
Saxifraga granulata L.	Saxifrage granulée	Saxifrage, Meadow
Scabiosa columbaria L.	Scabieuse columbaire	Scabious, Small
Schedonorus pratensis subsp. pratensis (Huds.) P.Beauv.	Fétuque des prés	Fescue, Meadow
Sedum hirsutum All.	Orpin hérissé	Stonecrop, Hairy
Sherardia arvensis L.	Rubéole	Field Madder
Silene gallica L.	Silène de France	Catchfly, French
Silene italica subsp. italica (L.) Pers.	Silène d'Italie	Catchfly, Italian
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris	Silène enflé	Campion, Bladder
Thymus nitens Lamotte	Thym luisant (Cévenol)	Thyme, (Cévenol)
Trifolium campestre Schreb.	Trèfle des champs	Trefoil, Hop
Trifolium incarnatum var. molinerii	Trèfle incarnat sauvage	Clover, Long-headed
Trifolium pratense var. pratense L.	Trèfle des prés	Clover, Red
Trifolium repens L. var. repens	Trèfle blanc	Clover, White
Trifolium striatum L.	Trèfle strié	Trefoil, Soft
Tussilago farfara L.	Tacconet	Coltsfoot
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Mâche	Lamb's Lettuce
Verbascum pulverulentum Vill.	Molène pulvérulente	Mullein, Hoary
Veronica beccabunga L.	Salade de chouette	Brooklime
Vicia angustifolia L.	Vesce à feuilles étroites	Vetch, Narrow-leaved
Vicia tenuifolia Roth	Vesce à folioles tenues	Vetch, Fine-leaved

2: Après-midi Falaises schisteux ombragées (parfois avec suintements) et bord de la route cont./...		
LatinTaxRef	Français	English
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde	Leek, Round-headed
<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis bouffon	Orchid, Green-winged
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	Anarrhinum à feuilles de pâquerette	Snapdragon, Blue
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	Sweet vernal grass
<i>Asphodelus cerasifer</i> J.Gay	Asphodèle-cerise	Asphodel, (Cherry)
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Asplénium noir	Spleenwort, Black
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Doradille du nord	Spleenwort, Forked
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>trichomanes</i> L.	Capillaire des murailles	Spleenwort, Maiden-hair
<i>Briza media</i> L.	Amourette	Quaking-Grass, Common
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens	Chardon noircissant	Thistle [blackening]
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	Sweet Chestnut
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	Centaurée jacée	Knapweed, Brown-rayed
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée sauvage	Chicory
<i>Cistus salviifolius</i> L.	Ciste à feuilles de sauge	Cistus, Sage-leaved
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas	Genêt purgatif	Broom, Purgative
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais	Broom, Common
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Orchis maculé	Orchid, Heath Spotted
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Orchis sureau	Orchid, Elder-flowered
<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	Potentille des Rochers	Cinquefoil, Rock
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine vulgaire	Viper's Bugloss
<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	Heather, Bell
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. subsp. <i>cutarium</i>	Bec-de-grue	Storksbill
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire (f.) à feuilles de Chanvre	Hemp Agrimony
<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.	Fétuque d'Auvergne	Fescue, (Auvergne)
<i>Filago germanica</i> L.	Cotonnière commune	Cudweed, Common
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	Ash
<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> (L.)	Genêt poilu	Greenweed, Hairy
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium colombin	Cranesbill, Long-stalked
<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant	Cranesbill, Shining
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	Cranesbill, Round-leaved
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème commune	Rock-Rose, Common
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	Hawkweed, Wall
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fer-a-Cheval	Vetch, Horseshoe
<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	Orpin, Grand	Orpine, (Large)
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	Flax, Purgative
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Cotonnière naine	Cudweed, Slender
<i>Lunaria annua</i> L.	Monnaie-du-Pape	Honesty
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Fleur-de-coucou	Ragged Robin
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	Mint, Apple
<i>Morus nigra</i> L. ???	Mûrier noir	Mulberry, Black

.../cont. 2: Après-midi Falaises schisteux ombragées (parfois avec suintements) et bord de la route		
LatinTaxRef	Français	English
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis brûlé	Orchid, Burnt
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.	Grande Listère	Twayblade
Ophrys scolopax subsp. scolopax Cav.	Ophrys bécasse	Orchid, Woodcock
Orchis mascula (L.) L.	Orchis mâle	Orchid, Early Purple
Ornithogalum kochii Parl.	Ornithogale à feuilles ténués	Star-of-Bethlehem, [Erect-leaved]
Ornithogalum orthophyllum Ten.	Ornithogale à feuilles ténués	Star-of-Bethlehem, [Erect-leaved]
Orobanche minor Sm.	Orobanche du trèfle	Broomrape, Lesser
Orobanche rapum-genistae Thuill.	Orobanche du gânet	Broomrape, Greater
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987	Orpin réfléchi	Stonecrop, Reflexed
Phyteuma spicatum L.	Raiponce en épis	Rampion, Spiked
Plantago lanceolata L.	Herbe à cinq cotes	Plantain, Ribwort
Plantago media L.	Plantain, Moyen	Plantain, Hoary
Plantago subulata var. capitellata (Ramond ex DC.)	Plantain caréné	Plantain, Rock
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.	Platanthère (f.) verdâtre	Orchid, Greater Butterfly
Polygala vulgaris L.	Polygala commun	Milkwort, Common
Potentilla argentea L.	Potentille argentée	Cinquefoil, Hoary
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Fougère aigle	Braken
Quercus petraea (Matt.) Liebl.	Chêne sessile	Oak, Sessile
Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	Buttercup, Bulbous
Rhinanthus minor L.	Cocriste	Yellow Rattle, Common
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.	Rorippe des Pyrénées	Yellow-cress, Pyrenean
Rumex acetosella L.	Oseille de brebis	Sheep's Sorrel
Sambucus nigra L.	Sureau	Elder
Saxifraga fragosoi Sennen	Saxifrage faux-hypne	Saxifrage, Mossy
Schedonorus pratensis subsp. pratensis (Huds.) P.Beauv.	Fétuque des prés	Fescue, Meadow
Sedum album L.	Orpin blanc	Stonecrop, White
Sedum hirsutum All.	Orpin hérissé	Stonecrop, Hairy
Serapias lingua L.	Sérapias à languette	Orchid, Tongue
Silene italica subsp. italica (L.) Pers.	Silène d'Italie	Catchfly, Italian
Silene latifolia Poir.	Silène blanc, Compagnon blanc	Campion, White
Silene nutans L. subsp. nutans	Silène penché	Catchfly, Nottingham
Thymus nitens Lamotte	Thym luisant (Cévenol)	Thyme, (Cévenol)
Torilis africana var. heterophylla (Guss.) Reduron	Torilis pourpre	Burr Parsley, (Purple)
Trifolium campestre Schreb.	Trèfle des champs	Trefoil, Hop
Trifolium ochroleucon Huds.	Trèfle jaunâtre	Clover, Sulphur
Trifolium pratense var. pratense L.	Trèfle des prés	Clover, Red
Verbascum thapsus subsp. thapsus L.	Bouillon blanc	Mullein, Aaron's Rod
Vicia angustifolia L.	Vesce à feuilles étroites (gousses noir)	Vetch, Narrow-leaved