

Sortie Runes 29-05-2022


Pâturage sur le flanc sud-ouest de Mont Lozère 44.38117 3.67746, 1000 à 1400 m

Compte Rendu Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistants: David & Mary Dickenson, Christiane Duchamp, Jean-Claude Paulet, Marc Boboeuf, Nadine Vilas, Marie-Félice Villette, Marie-Pierre & Michel Tuffery, Marie Haag, Anne-Marie Lemmonier, Alan & Mary Cranston, Barbara Tixier

Toutes les fleurs
Naturescene.net

Retrouver les autres
compte-rendus sur
www.naturescene.net/barmies



La liste des plantes se trouve à la fin du compte-rendu

HABITATS PRINCIPALS EXPLORÉS :

Correspondance avec les codes sur EUNIS sur https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf

Codes Corines :

1) Corine : 35 Pelouses montagnards sur silice

David Dickenson david@naturescene.co.uk

La géologie de notre sortie n'était pas compliquée. Tout le flanc sud-ouest de Mont Lozère est du granite. Le sommet de Mont Lozère, à 1700 m, est très arrondi, mais autour du village de Runes à 1000 m, il y a les gros blocs de granite et un sol très sableux en forte pente. Le village est reconnu pour sa cascade, avec une chute de 70 m, mais aujourd'hui les Barmies vont traverser la route pour prospecter les pelouses très typiques de la région.

Peut-être à cause de la chaleur, ou peut-être l'âge avancé de l'auteur, l'appareil-photo restait chez lui, donc les images de ce compte-rendu sont un mélange ou du portable, ou des autres Barmies, ou du même endroit en 2021.

Mes excuses.

Normalement de mi-juin à fin septembre les vaches de la race Aubrac sont mise à pâturer sur les pelouses de notre prospection. Toujours embêtant pour les botanistes, l'intention était d'aller avant leur arrivée. Mais avec le printemps très en avance, elles étaient déjà là. Heureusement elles n'étaient pas monté trop haut, laissant beaucoup des fleurs à regarder et admirer.

Les Barmies passent un moment paisible avec les vaches, et se renseignent sur les meilleures zones à prospecter




En quittant le village, il y avait un vieil abreuvoir. Les blocs de granite ombragés et humides par les éclaboussements d'eau, c'était typiquement couvert par la dorine à feuilles opposées (*Chrysosplenium oppositifolium*).



La dorine à feuilles opposées
Chrysosplenium oppositifolium

On n'est pas monté le chemin plus de 100 m qu'on a rencontré le plus grand défi de notre sortie. Parmi les espèces rudérales se trouvait quelques plantes d'une Brassicaceae à feuilles glauques et très engainantes. C'était inhabituellement trapu et malformée.



L'arabette glabre
Turritis glabra
(Malformée)

Perplexe, l'auteur a gardé une feuille basale pour l'identifier.

Avec les poils ramifiés, il s'agit de l'arabette glabre (*Turritis glabra*). Normalement une plante élancée et peu ramifiée, c'est probable que c'était atteint d'une maladie.

Sa présence est localisée autour de Mont Lozère à cette hauteur.



La **céraiste des champs** (*Cerastium arvense*) était partout aux bords du chemin, très florifère. Ici, il s'agit de la **sous-espèce arvense**, avec les grosses fleurs et les pédicelles/pédoncles souvent glanduleux. Si on avait eu le temps pour monter le chemin au-dessus de 1200 m, on verrait plutôt *Cerastium arvense* subsp. *strictum*, une plante plus grêle, les fleurs plus petites, souvent uniflores, et les pédicelles sans poils glanduleux.



La **céraiste des champs**
Cerastium arvense
Au-dessous de 1200 m



La **céraiste des champs**
Cerastium arvense
Sur les hauts pelouses

Après l'embranchement, le chemin est devenu un sentier. En été, il est emprunté par les vaches tout le temps, donc on a trouvé une végétation résistante à piétinement.

La **potentille argentée** (*Potentilla argentea*) avec les feuilles argentées au-dessous, la **spergulaire rouge** (*Spergula rubra*), courant autour les parkings, et les deux **scléranthes**, le **scléranthe vivace** (*Scleranthus perennis* subsp. *perennis*) et, moins courant, le **scléranthe annuel** (*Scleranthus annuus* subsp. *annuus*).



La **potentille argentée**
Potentilla argentea



La **spergulaire rouge**
Spergula rubra

Les plantes qui résistent le piétinement




Le **scléranthe vivace**
Scleranthus perennis subsp. *perennis*



Le **scléranthe annuel**
Scleranthus annuus subsp. *annuus*

Partout le pâturage était défavorisé par l'abondance des 2 genêts en concurrence, le **genêt à balais** (*Cytisus scoparius*) et le **genêt purgatif** (*Cytisus oromediterraneus*).



Beaucoup plus localisés, les espèces de genêts plus petites, le **genêt anglais** (*Genista anglica*), qui a piqué la plupart de notre groupe (oui, que les Français), et le **genêt ailé** (*Genista sagittalis*), avec ses tiges ailées.



Le genêt anglais
Genista anglica



Le genêt ailé
Genista sagittalis



On a choisi le meilleur pâturage sans des gros blocs de granit pour notre tir-de-sac, avec un rare arbre pour ombre.



La brunelle à grands fleurs
Prunella grandiflora

Il y avait quelques fleurs pourpres d'intérêt. On a noté la **brunelle à grandes fleurs (*Prunella grandiflora*)**, qui se distingue de *Prunella vulgaris* (qui aussi a des feuilles entières) par l'absence des deux feuilles qui engainent l'épi. Dépit le nom, la différence de taille n'est pas fiable. Les flores dit sol neutre à calcaire, mais ils ne sont pas rares sur Mont Lozère.

Sur la photo des arméries des sables (*Armeria arenaria* subsp. *arenaria*), on voit les Barmies attirés par un pourpre plus foncé, l'oeillet des Chartreux (*Dianthus carthusianorum* subsp. *carthusianorum*), qui se distingue de l'autre œillet à fascicules dense, *Dianthus armeria*, par les bractées semblables aux écailles plutôt que des bractées herbacées.



Les arméries des sables *Armeria arenaria* subsp. *arenaria* et au centre, quelques oeillets des Chartreux

Plus courantes, on a trouvé toute la journée quelques *Dianthus deltoides* et *Dianthus seguieri* subsp. *pseudocollinus* (voir www.naturescene.net/barmies/Gasbiel_7-2020.pdf).



L'oeillet des Chartreux
Dianthus carthusianorum
subsp. *carthusianorum*



L'année précédente (2021), l'auteur a trouvé sur le sentier à plusieurs endroits, une abondance de la **véronique à feuilles trilobées (*Veronica triphyllos*)**. Il a voulu l'a montré aux Barmies, mais malheureusement il n'y avait aucune signe de cette rareté annuel aujourd'hui.

La véronique à feuilles trilobées
Veronica triphyllos
qui nous a échappée aujourd'hui



Par récompense, attirait par les **narcisses des poètes** sur une pente humide, on avait trouvé une très belle graminée rare, du couleur riche de pourpre-brun.

La **fétuque des ruisseaux** (*Festuca rivularis*) faisait une contraste forte avec la fétuque phare de cette région, la **fétuque d'Auvergne** (*Festuca arvernensis*).



La narciss des poètes
Narcissus poeticus



La fétuque des ruisseaux
Festuca rivularis




La fétuque d'Auvergne
Festuca arvernensis

Hors des zones couvertes des genêts, le pâturage était enrichi par quelques espèces des trèfles : le **trèfle incarnat sauvage** (*Trifolium incarnatum* var. *molinerii*), le **trèfle jaunâtre** (*Trifolium ochroleucon*), et les plus banales de tous, le **trèfle des prés** (*Trifolium pratense* subsp. *pratense* var. *pratense*) et le **trèfle blanc** (*Trifolium repens* var. *repens*).



Le trèfle incarnat sauvage
Trifolium incarnatum var.
molinerii



Le trèfle jaunâtre
Trifolium ochroleucon



Le trèfle des prés
Trifolium pratense subsp.
pratense var. *pratense*



Le trèfle blanc
Trifolium repens
var. *repens*

[photos de la Salle Prunet]

Ces trèfles sont très répandus sur notre région ; riches en azotes, ils sont essentiels pour une bonne alimentation du bétail, et ajoutent de l'azote dans le sol.

La chaleur est devenue étouffant, et sauf pour les souris, il n'y avait aucune ombre.


Au lieu de faire une boucle, les Barmies sont redescendus. Mais, à l'embranchement, on a pris l'autre chemin au but de retrouver une source intéressante qui traversait le chemin.

Une source que traverse
l'embranchement gauche du sentier



Le fleur-de-coucou
Lychnis flos-cuculi

Il a valu la peine. On a trouvé quelques **fleurs-de-coucou** (*Lychnis flos-cuculi*), pas courants localement, et le **rossolis à feuilles rondes** (*Drosera rotundifolia*), tant aimé par tout le monde.



Le rossolis à feuilles rondes
Drosera rotundifolia



La laïche vert jaunâtre
Carex demissa

En plus de la laïche bleuâtre (*Carex panicea*) qu'on a déjà vu à Bézuc récemment (voir [www.naturescene.net/barmies/Bezuc 5-2022.pdf](http://www.naturescene.net/barmies/Bezuc%205-2022.pdf)) on a trouvé la **laïche vert jaunâtre** (*Carex demissa*), facile à identifier par ses feuilles jaunâtre, et sa présence jusqu'au bord de l'eau.



La renoncule flammette
Ranunculus flammula

Aussi présente, la **renoncule flammette** (*Ranunculus flammula*), rarement noté dans nos sorties, qui se trouve dans les zones marécageux et les flaques d'eau temporaires.

On est retourné au village de Runes ; les habitants s'amusaient voir les gens s'intéresser et photographier les 'mauvaises herbes' autour d'eux. Qui sait, peut-être l'un d'eux vais devenir un Barmy Botanist un de ces jours.

(1) Pâturage au-dessus de Runes

LatinTaxRef	Francais	English
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	Yarrow
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampantre	Bugle
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>arenaria</i>	Armérie (f.) des sables	Thrift, Jersey
<i>Briza media</i> L.	Amourette	Quaking-Grass, Common
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens	Chardon noircissant	Thistle [blackening]
<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	Céraiste des champs	Mouse-ear, Field
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	Saxifrage, Opposite-leaved Golden
<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.	Chou giroflée	Wallflower Cabbage
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	Génotte	Pignut
<i>Crepis albida</i> Vill.	Crépide blanchâtre	Hawks-beard, Whitened
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisetie	Crosswort
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas	Genêt purgatif	Broom, Purgative
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais	Broom, Common
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle peletonné	Cock's-foot
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Orchis maculé	Orchid, Heath Spotted
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Orchis sureau	Orchid, Elder-flowered
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	Pink, Clusterhead
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Oeillet deltoide	Pink, Maiden
<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	Oeillet des bois	Pink, Woodland
<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguelén & Markgr.-Dann.	Fétuque d'Auvergne	Fescue, (Auvergne)
<i>Festuca rivularis</i> Boiss.	Fétuque des ruisseaux	Fescue, (Streamside)
<i>Galium album</i> Mill.	Caille-lait commun	Bedstraw, Great Erect Hedge
<i>Galium mollugo</i> L.	Caille-lait blanc	Bedstraw, Hedge
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Gaillet jaune	Bedstraw, Lady's
<i>Genista anglica</i> L.	Genêt anglais	Greenweed, English
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	Broom, Winged
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	Gentian, Yellow
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	Cranesbill, Hedgerow
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Géranium des bois	Cranesbill, Wood
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	Yorkshire fog
<i>Jasione montana</i> L.	Jasione des montagnes	Sheepsbit, Mountain
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	Scabious, Field
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Lamier à feuilles panachées	Dead-nettle, Spotted
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i>	Lapsane commune	Nipplewort, Perennial
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	Vetchling, Meadow
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	Marguerite	Ox-eye daisy
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Cotonnière naine	Cudweed, Slender
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Bird's-foot trefoil, Common
<i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>teresiana</i> (Sennen) Grau	Myosotis des bois	Forget-me-not, Wood
<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	Narcissus, Pheasant's eye

(1) Pâturage au-dessus de Runes

LatinTaxRef	Francais	English
Ornithogalum orthophyllum Ten.	Ornithogale à feuilles ténues	Star-of-Bethlehem, [Erect-leaved]
Orobanche rapum-genistae Thuill.	Orobanche	Broomrape, Greater
Phyteuma gallicum R.Schulz	Raiponce de France	Rampion, French
Phyteuma orbiculare L.	Raiponce globulaire	Rampion, Round-headed
Plantago holosteam Scop.	Plantain caréné	Plantain, Rock
Polygala vulgaris L.	Polygala commun	Milkwort, Common
Potentilla argentea L.	Potentille argentée	Cinquefoil, Hoary
Potentilla erecta (L.) Räusch.	Potentille dressée	Tormentil
Potentilla recta L.	Potentille dressée	Potentilla, Sulphur
Poterium sanguisorba L.	Pimprenelle Petite	Burnet, Salad/Fodder
Prunella grandiflora (L.) Schöller	Brunelle à grandes fleurs	Self-Heal, Large
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Fougère aigle	Braken
Rosa canina L.	Eglantier des chiens	Rose, Dog
Scleranthus annuus L. subsp. annuus	Scléranthe annuel	Knawel, Annual
Scleranthus perennis L. subsp. perennis	Scléranthe vivace	Knawel, Perennial
Sedum dasyphyllum L.	Orpin à feuilles épaisses	Stonecrop, Thick-leaved
Sedum hirsutum All.	Orpin hérissé	Stonecrop, Hairy
Silene latifolia Poir.	Silène blanc, Compagnon blanc	Campion, White
Silene nutans L. subsp. nutans	Silène penché	Catchfly, Nottingham
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris	Silène enflé	Campion, Bladder
Spergula rubra (L.) D.Dietr.	Spergulaire rouge	Spurrey, Sand
Tanacetum vulgare L.	Tanaïsie	Tansy
Thymus pseudochamaedrys (Heinr.Braun) Ronniger	Thym faux petit-chêne	Thyme, [Variable hairy]
Trifolium campestre Schreb.	Trèfle des champs	Trefoil, Hop
Trifolium incarnatum var. molinerii (Balb. ex Hornem.) Ser.	Trèfle incarnat sauvage	Clover, Long-headed
Trifolium ochroleucon Huds.	Trèfle jaunâtre	Clover, Sulphur
Trifolium pratense L. subsp. pratense var. pratense	Trèfle des prés	Clover, Red
Trifolium repens L. var. repens	Trèfle blanc	Clover, White
Turritis glabra L.	Arabette glabree	Mustard, Tower
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	Nombril de Vénus	Pennywort, Wall
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Mâche	Lamb's Lettuce
Verbascum lychnitis L.	Molène lychnite	Mullein, White
Veronica chamaedrys L.	Véronique petit-chêne	Speedwell, Germander
Veronica hederifolia L.	Véronique à feuilles de lierre	Speedwell, Ivy-leaved

(2) Quelques zones humides

LatinTaxRef	Francais	English
Bistorta officinalis Delarbre	Renouée bistorte, Serpentaire	Bistort
Caltha palustris L.	Populage, Caltha des marais	Kingcup, Marsh Marigold
Carex demissa Vahl ex Hartm.	Laîche vert jaunâtre	Sedge, Common Yellow
Carex panicea L.	Laiche bleuâtre	Sedge, Carnation
Cirsium palustre (L.) Scop.	Cirse des marais	Thistle, Marsh
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	Dactylorhize de mai	Orchid, Broad-leaved Marsh
Drosera rotundifolia L.	Rosolis à feuilles rondes	Sundew, Round-leaved
Lychnis flos-cuculi L.	Fleur-de-coucou	Ragged Robin
Ranunculus acris L. subsp. acris	Bouton d'or	Buttercup, Meadow
Ranunculus flammula L.	Renoncule flammette	Spearwort, Lesser
Veratrum album L.	Héllibore blanc	White False Helleborine