

Sortie Le Cheval Mort 27-07-2025

Aux hauteurs de la Margeride 1310—1460 m


GPS: 44.66786 3.54386 à 1450 m (Col du Cheval Mort)

44,66975 3.55661 à 1410 m (l'Aqueduc Double)

44.67085 3.58064 à 1300 m (Baraque de Pompeyrenc)

Compte Rendu Barmy Botanists

Assistants : Jean Claude Saintleger, David & Mary Dickenson, Marie-Pierre Tuffery, Mathilde Esselin, Claude Portier, Christiane Duchamp, Marc Boboeuf, Barbara Tixier, Anne-Marie Lemonnier, Marie-Felice Villette



La liste des plantes se trouve à la fin du compte rendu

HABITATS PRINCIPAUX EXPLORÉS :

Correspondance avec les codes sur EUNIS sur https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf

Codes Corines :

51.11 Tourbières hautes Base de sphaignes colorées/sphaignes vertes/buissons à callune/buissons de myrtille et d'airelles

54.422 Bas marais acides subatlantiques à laïche noire, laïche courte et laïche en étoile

54.46 Bas marais à linaigrette à feuilles étroites

Impressionné par la Tourbière du Trévezel il y a 2 semaines (www.naturescene.net/barmies/Trevezel_7-2025.pdf), les Barmies ont décidé prospecter une autre tourbière, mais d'un caractère très différent.



Sabot encourage les gens au Col de Cheval Mort

La matricaire odorante (*Matricaria discoidea*), typique des parkings, était facile d'identifier les yeux bandés, avec son parfum d'ananas.



La matricaire odorante (*Matricaria discoidea*)



Il y avait une plante moins courante ; les feuilles et capsules ont suggéré une sabline. Avec une loupe, on peut voir un bouton à pétales roses, et toute la plante était glanduleuse. Il s'agit de la **spergulaire rouge** (*Spergularia rubra*).

La spergulaire rouge (*Spergularia rubra*)



Une autre difficile : heureusement les Barmies l'ont déjà vu, une espèce peu courante sur la Margeride (www.naturescene.net/barmies/Charpal_8-2021.pdf), le **gnaphale des marais** (*Gnaphalium uliginosum*).

À la première vue, il ressemble une forme rachitique du gnaphale des bois (*Omalotheca sylvatica*), mais c'est rameux dès la base, plus tomentose à feuilles spatulées.

Dépit son nom, il est typique des terrains inondés en hiver et desséchant en été, comme les flaques d'eau. C'est noté rare, mais plus probablement il passe inaperçu très souvent.

La renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* subsp. *aviculare*)

L'omniprésente **renouée des oiseaux** (*Polygonum aviculare* subsp. *aviculare*) sur le parking ne pouvait pas échapper l'objectif de nos appareils.



Le gnaphale des marais (*Gnaphalium uliginosum*)



Une autre plante toute rouge avait une forme piétinée et rachitique ; c'était partout.

Au début, c'était un défi d'identification, mais en regardant le cortège au bord de la route, on a réalisé qu'avec sa tige carrée il s'agissait de l'**épilobe à quatre angles** (*Epilobium tetragonum subsp. tetragonum*).

L'épilobe à quatre angles
(*Epilobium tetragonum subsp. tetragonum*)

Nos yeux ont tourné vers la végétation au bord de la route, qui ressemblait une mégaphorbaie. C'était une végétation très luxuriante, un peu avec les pieds dans l'eau, et de tous les couleurs.

Il y avait deux aliens, bien établis.

La **collomia à grandes fleurs** (*Collomia grandiflora*) est d'origine les Andes du Chili. Elle se trouve parfois au bords des routes des hauteurs de la Margeride, et pas d'ailleurs.



La collomia à grandes fleurs (*Collomia grandiflora*)



Le mimule tacheté
(*Erythranthe guttata*)




Le **mimule tacheté** (*Erythranthe guttata*) est un alien originaire d'Amérique.

C'est plus costaud, plus invasif, et se trouve plutôt dans les fossés au bord des routes et des ruisseaux de la Margeride et l'Aubrac.

Le jaune vif du **séneçon de Fuchs** (*Solidago Senecio ovatus subsp. alpestris*) faisait concurrence avec le rose de l'**épilobe à feuilles étroites** (*Chamaenerion angustifolium*) (attention, ce n'est plus *Epilobium angustifolium*).

Ce dernier m'a rappelée mon enfance, parce qu'il avait vite colonisé les cratères des bombes après la 2^{ème} guerre mondiale.



Le séneçon de Fuchs et l'épilobe à feuilles étroites
(*Senecio ovatus subsp. alpestris*) (*Chamaenerion angustifolium*)



Il y avait deux espèces de molènes présentes, y inclus le **bouillon blanc (*Verbascum thapsus* subsp. *thapsus*)**, avec son épi simple, pas ramifié, et surtout ses feuilles fortement décurrentes.

Le bouillon blanc
Verbascum thapsus
subsp. *thapsus*)



La deuxième, la **molène noire (*Verbascum nigrum*)**, se trouve sur les hauteurs d'Aubrac et la Margeride. Normalement, elle possède aussi un épi simple, mais se différencie immédiatement par ses étamines à poils violet.

Une autre avec les étamines à poils violet, la molène de Boerhaave (*Verbascum boerhaviai*) se trouve que autour de Florac, et elle est plus précoce.

La molène noire
(*Verbascum nigrum*)

Avec la molène noire les anthères sont toutes insérées en travers, mais pour la molène de Boerhaave 2 des 5 anthères sont insérées obliquement.



La molène noire (*Verbascum nigrum*)

Pas toujours facile à déterminer ! Heureusement il y a un autre critère ; les feuilles en bas de la molène noire sont longuement pétiolées.

Après un peu de temps, on a repris la route sur 800m jusqu'à l'endroit où la route traverse le **Valat de l'Aqueduc Double**. C'est un tributaire du Chapeauroux, qui devient l'Allier, et éventuellement, la Loire. Jean Claude a voulu nous introduire à cette tourbière en forte contraste avec celle du Trévezel.


Que 100m plus haute que Trévezel, elle se trouve dans le climat atlantique, au lieu de la ligne de partage des eaux méditerranéenne/atlantique. Donc bien plus frais, sur une pente plus forte, elle était plus ombragée. Au lieu des boisements artificiels de Mont Aigoual, elle possède un cortège des plantes peu perturbé depuis des siècles, un patrimoine de haute valeur.



En descendant, on se trouvait dans une « forêt » primaire de **la prêle des bois (*Equisetum sylvaticum*)**.

On a attendu un *Tyrannosaurus rex* sortir de l'ombre à tout moment.

La prêle des bois
(*Equisetum sylvaticum*)



Des arbrisseaux du
bouleau blanc (*Betula pubescens*)

Le **bouleau blanc (*Betula pubescens*)** était présent en toutes les tailles. C'était une plante pionnière des landes après la dernière ère glaciaire, et rien a changé.

On a commencé notre journée sur le Col du Cheval Mort, au-dessus de Froidviala, donc localement on attend toujours le réchauffement climatique.

L'**agrostide des chiens (*Agrostis canina*)**, qu'on a rencontré pour la première fois au Trévezel, était la graminée dominante.

Il avait l'air plus libre, moins contraignés.

L'agrostide des chiens (*Agrostis canina*)



En descendant, il y avait un peu plus de lumière, plus de l'eau et un cortège des espèces qu'on connaît mieux des tourbières de Mont Lozère et l'Aubrac.

Il y avait quelques espèces de sphaignes. Mathilde Esselin, une nouvelle aux Barmies et une expérimentée des tourbières plus au nord de la France, a expliqué comment les espèces différentes des sphaignes sont un indice utile des gradients d'humidité.



Les sphaignes *Sphagnum* spp.



La parnassie des marais (*Parnassia palustris*)

Aujourd'hui, on a trouvé quelques **parnassie des marais** (*Parnassia palustris*), peut-être mon favori à cause des pétales délicates et translucides.



Le rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*)

On était déçu avec le **rossolis à feuilles rondes** (*Drosera rotundifolia*). Plus content des endroits très ensoleillés, il a manqué tous ses couleurs, et avait l'aspect plutôt d'un fantôme.



L'airelle à petits fruits (*Vaccinium microcarpum*)

Plus attirante était l'**airelle (canneberge) à petits fruits** (*Vaccinium microcarpum*).

Peu courant en Lozère, l'auteur l'a rencontré pour la première fois sur les hauteurs de Mont Lozère en compagnie de *Hammarbya paludosa*, cette petite orchidée liste rouge qui est très exigeante pour une eau très propre qui transfuse les sphaignes.



Vaccinium microcarpum sur Mont Lozère



Un autre plaisir était de revoir la **gentiane des marais** (*Gentiana pneumonanthe*).

Évidemment, la première chose les Barmies ont fait était de chercher (et trouver !) les œufs de l'azuré des mouillères (*Phengaris alcon*), un papillon très rare, qui est 100% dépendant sur ses fleurs pour nourrir les chenilles avant qu'elles sont prises par les fourmis pour compléter leur cycle.

La gentiane des marais (*Gentiana pneumonanthe*)

Jusqu'à côté, une seule plante du **pédiculaire des bois** (*Pedicularis sylvatica*).


On peut le distinguer de *Pedicularis palustris* par le casque nettement à l'angle droit que la lèvre inférieure (au lieu d'un angle de 10-30°) ; s'il y a des doutes, il faut une loupe pour vérifier les cils aux bords des dents du calice (malheureusement pas visible sur la photo).

En tout cas, *P. palustris*, qui a une préférence pour les zones un peu plus trempées, est beaucoup moins courant.

La pédiculaire des bois (*Pedicularis sylvatica*)



On a fait notre pique-nique en confort à la Baraque de Pompeyrenc, chez Jean Claude. Ce n'était pas la première fois (voir www.naturescene.net/barmies/Pompeyrenc_7-2022.pdf), et c'était plutôt une forme de révision pour les Barmies.



Le fossé au bord du chemin est resté humide cet été, et c'était resplendissant en végétation. On a admiré les belles **angéliques des bois** (*Angelica sylvestris*) parmi d'autres.

L'angélique des bois (*Angelica sylvestris*)



Sur le chemin, les Barmies étaient atteintes d'une attaque des vers.

Heureusement, c'était que les femmes, et avec leur fortitude habituelle, elles ont survécu.

L'attaque des vers
d'origine *Juncus effusus*



On a vu la **laiche muricat** (*Carex muricata*).

C'est assez courant chez nous à toutes hauteurs ; dans son groupe de 2 stigmates, épis à fleurs mâles à la base, c'est assez facile à identifier en fruit, avec sa carène distinctement ailée.



La laiche muricat
(*Carex muricata*)



On est descendu regarder le Chaperoux, que trois kilomètres en aval de la tourbière du matin.



La reine-des-prés (*Filipendula ulmaria*) était très bien assortie avec la valériane à petites feuilles (*Valeriana officinalis* groupe).

On n'a plus le droit de l'appeler *Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia*. On n'accepte plus les sous-espèces, ni les variétés.

Ce qui simplifie des choses, jusqu'au le moment qu'on la renomme encore.



La reine-des-prés et la valériane à petites feuilles
(*Filipendula ulmaria*) (*Valeriana officinalis*)

La hêtraie l'autre côté de la rivière était tout près, et il y avait quelques plantes un peu spéciales. La laitue de Plumier (*Lactuca plumieri*) était fin floraison.

C'est assez rare, une espèce de la Margeride (et le versant nord du Mont Lozère). C'était la seule laitue, sauf la latue perenne (*Lactuca perennis*), d'avoir les fleurs bleues, mais avec sa hauteur et la taille des feuilles, on ne peut pas se tromper.



La laitue de Plumier (*Lactuca plumieri*)



L'autre était le sceau-de-Salomon verticillé (*Polygonatum verticillatum*), déjà en fruit.

Le sceau-de-Salomon verticillé (*Polygonatum verticillatum*)



La glycérie plissée (*Glyceria notata*)

Au bord de l'eau, suivant notre succès à la tourbière du Trévezel, on a identifié très vite **la glycérie plissée (*Glyceria notata*)** par la glumelle supérieure (la paléole) à 2 dents apicales courtes.

En plus, c'était abondante en face de la baraque, mais Jean Claude l'a mal-identifié. Il a des excuses, avec ce genre difficile.

Il a pris sa revanche en demandant l'auteur d'identifier une autre graminée sur le seuil de sa porte. Jean Claude l'a déjà identifié, et l'auteur a passé une soirée frustrante en compagnie des flores.

Ce n'était évidemment pas une espèce courante, et en effet, elle ne se trouvait pas en Flore de la Méditerranée. Mais c'était décrit en Flora Gallica, comme alien de l'Amérique Nord. Il s'agit du **brome de Sitka (*Ceratochloa sitchensis*)**.



Le brome de Sitka (*Ceratochloa sitchensis*)



En admettant que Jean Claude a fait le premier signalement en Lozère, ce brome de Sitka était en toute probabilité parmi le repas des vaches en face de la Baraque de Pompeyren depuis un peu.

Parking Col du Cheval Mort et un peu du

LatinTaxRef	Francais	English
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	Yarrow
<i>Achillea ptarmica</i> L. subsp. <i>pyrenaica</i> / <i>ptarmica</i>	Herbe-à-éternuer	Sneezewort
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Alchémille jaune vert	Lady's Mantle
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	Mugwort
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau pendant	Birch, Silver
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	Renouée bistorte, Serpenteaire	Bistort
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage, Caltha des marais	Kingcup, Marsh Marigold
<i>Carex leporina</i> L.	Laiche des lièvres	Sedge, Common Hare
<i>Centaurea nigra</i> L.	Centaurée noir	Knapweed, Common
<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop	Epilobe à feuilles étroites	Willow-herb, Rosebay
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse aranéeux	Thistle, Woolly
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	Thistle, Marsh
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl.	Collomia à grandes fleurs	Collomia, Grand
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas	Genêt purgatif	Broom, Purgative
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais	Broom, Common
<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	Oeillet des bois	Pink, Woodland
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre (f.)	Foxglove
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum	Epilobe à quatre angles	Willow-herb, Square-stalked
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom	Mimule tacheté	Monkeyflower, Streamside
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine-des-prés	Meadow-sweet
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Galéopsis tétrahit	Hemp-Nettle, Common
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Gaillet jaune	Bedstraw, Lady's
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	Cranesbill, Hedgerow
Gnaphalium uliginosum L.	Gnaphale des marais	Cudweed, Marsh
<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Berce de Sibérie	Hogweed, [Siberian]
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i> L.	Millepertuis aux mille trous	St. John's Wort, Perforate
<i>Jasione laevis</i> Lam.	Jasione pérenne	Sheepsbit, Perennial
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à fleurs aigues	Rush, Sharp-flowered
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc articulé	Rush, Jointed
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc diffus	Rush, Soft
<i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó	Knautie d'Auvergne	Scabious, of Auvergne
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.	Laitue des murs	Lettuce, Wall
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	Lettuce, Bitter
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	Vetchling, Meadow
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rayée	Toadflax, Pale
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier pédonculé	Bird's-foot trefoil, Greater
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet	Lily, May
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire odorante	Mayweed, Rayless, Pineapple weed

Parking Col du Cheval Mort et un peu du deuxième parking /cont.

LatinTaxRef	Francais	English
Melampyrum pratense L.	Mélampyre des prés	Cow-wheat, Common
Myosotis nemorosa Besser	Myosotis à poils réfractés	Forget-me-not, Marsh
Pedicularis sylvatica L.	Pédiculaire des bois	Lousewort
Plantago major subsp. major L.	Plantain, Grand	Plantain, Great
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare	Renouée des oiseaux	Knotgrass
Prunella vulgaris L.	Brunelle commune	Self-Heal, Common
Rhinanthus minor L.	Cocriste	Yellow Rattle, Common
Rubus idaeus L.	Framboisier	Raspberry
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius L.	Patience à feuilles obtuses	Dock, Broad-leaved
Scabiosa columbaria L.	Scabieuse columbaire	Scabious, Small
Scleranthus annuus L. subsp. annuus	Scléranthe annuel	Knawel, Annual
Senecio ovatus subsp. alpestris (Gaudin) Herborg	Séneçon de Fuchs	Ragwort, of Fuchs
Silene dioica (L.) Clairv.	Compagnon rouge	Campion, Red
Solidago virgaurea L.	Verge d'or	Golden-Rod
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl	Spergulaire rouge	Spurrey, Sand
Stellaria graminea L.	Stellaire graminée	Stitchwort, Lesser
Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak.	Barbe-de-bouc	Goat's-Beard
Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	Bilberry
Verbascum nigrum L.	Molène noire	Mullein, Dark
Verbascum thapsus subsp. thapsus L.	Bouillon blanc	Mullein, Aaron's Rod
Veronica scutellata L.	Veronique à écussons	Speedwell, Marsh
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia L.	Véronique à feuilles de serpolet	Speedwell, Thyme-leaved
Vicia cracca L.	Vesce à épis	Vetch, Tufted

Tourbière de l'Aqueduc Double		
LatinTaxRef	Francais	English
Agrostis canina L.	Agrostide	Bent, Silver
Betula pubescens Ehrh.	Bouleau blanc	Birch, Downy
Briza media L.	Amourette	Quaking-Grass, Common
Calluna vulgaris (L.) Hull	Bruyère commune	Heather, Ling
Carex caryophylla Latourr.	Laïche lisse	Sedge, Spring
Carex echinata Murray	Laiche étoilée	Sedge, Star
Carex vesicaria L.	Laiche à utricules renflés	Sedge, Bladder
Chaerophyllum aureum L.	Cerfeuil doré	Chervil, Golden
Cirsium palustre (L.) Scop.	Cirse des marais	Thistle, Marsh
Comarum palustre L.	Comaret	Cinquefoil, Marsh
Crepis paludosa (L.) Moench	Crépide des marais	Hawk's-beard, Marsh
Dactylorhiza maculata (L.) Soó	Dactylorhize tacheté	Orchid, Heath Spotted
Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus (P.Fourn.) Jauzein	Oeillet des bois	Pink, Woodland
Doronicum austriacum Jacq.	Doronic d'Autriche (m.)	Leopard's Bane, Austrian
Drosera rotundifolia L.	Rossolis à feuilles rondes	Sundew, Round-leaved
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Fougère male	Fern, Male
Epikeros pyrenaicus (L.) Raf.	Angélique des Pyrénées	Angelica, Pyrenean
Equisetum sylvaticum L.	Prêle des bois	Horsetail, Wood
Eriophorum angustifolium Honck.	Linaigrette à feuilles étroites	Cotton Grass, Common
Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	Gentian, Yellow
Gentiana pneumonanthe L.	Gentiane des marais	Gentian, Marsh
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à fleurs aigues	Rush, Sharp-flowered
Juncus squarrosus L.	Jonc rude	Rush, Heath
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	Luzule à fleurs nombreuses	Woodrush, Heath
Molinia caerulea (L.) Moench	Molinie bleue	Moor Grass, Purple
Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Grass of Parnassus
Pedicularis sylvatica L.	Pédiculaire des bois	Lousewort
Potentilla erecta (L.) Rausch.	Potentille dressée	Tormentil
Salix aurita L.	Saule à oreillettes	Willow, Round-leaved
Salix caprea L.	Saule marsault	Willow, Goat, Great Sallow
Salix pentandra L.	Saule à cinq étamines	Willow, Bay
Salix repens subsp. repens L.	Saule rampant	Willow, Creeping
Scorzonera humilis L.	Scorzonère peu élevé	Vipersgrass, Dwarf
Scrophularia nodosa L.	Scrofulaire noueuse	Figwort, Common
Succisa pratensis Moench	Succise-des-prés	Scabious, Devils-bit
Thalictrum aquilegifolium L.	Pigamon à feuilles d'ancolie	Meadow Rue
Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum (L.) Hartm.,	Scirpe cespiteux	Deer Grass
Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Airelle (canneberge) à petits fruits	Cranberry, Small
Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	Bilberry
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum (Lange) Tolm.	Airelle des marais	Bilberry, Bog
Veratrum album L.	Véâtre blanche	White False Helleborine
Veronica chamaedrys L.	Véronique petit-chêne	Speedwell, Germander

Chemin Baraque du Pompeyrenc		
LatinTaxRef	Francais	English
Acer pseudoplatanus L.	Érable sycomore	Sycamore
Achillea millefolium L.	Achillée millefeuille	Yarrow
Achillea ptarmica L. subsp. pyrenaica/ ptarmica	Herbe-à-éternuer	Sneezewort
Angelica sylvestris L.	Angélique des bois	Angelica, Wild
Aria edulis (Willd.) M.Roem	Alisier	Whitebeam
Betula pendula Roth	Bouleau pendant	Birch, Silver
Blitum bonus-henricus (L.) Rchb.	Epinard sauvage	Good King Henry
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	Shepherd's Purse
Carex muricata L.	Laiche muricat	Sedge, Large-fruited Prickly
Centaurea nigra L.	Centaurée noir	Knapweed, Common
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén	Corydale à vrilles (f.)	Corydalis, Climbing
Ceratochloa sitchensis (Trin.) Cope & Ryves	Brome de Sitka	Brome, Alaska
Chaerophyllum aureum L.	Cerfeuil doré	Chervil, Golden
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop	Epilobe à feuilles étroites	Willow-herb, Rosebay
Cirsium eriophorum (L.) Scop.	Cirse aranéeux	Thistle, Woolly
Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus (P.Fourn.) Jauzein	Oeillet des bois	Pink, Woodland
Digitalis purpurea L.	Digitale pourpre (f.)	Foxglove
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum	Epilobe à quatre angles	Willow-herb, Square- stalked
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Reine-des-prés	Meadow-sweet
Galeopsis tetrahit L.	Galéopsis tétrahit	Hemp-Nettle, Common
Galium palustre L.	Gaillet des marais	Bedstraw, Marsh
Galium verum L. subsp. verum	Gaillet jaune	Bedstraw, Lady's
Genista anglica L.	Genêt anglais	Greenweed, English
Genista sagittalis L.	Genêt ailé	Broom, Winged
Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	Gentian, Yellow
Geranium pyrenaicum Burm.f.	Géranium des Pyrénées	Cranesbill, Hedgerow
Geranium sylvaticum L.	Géranium des bois	Cranesbill, Wood
Hypericum perforatum subsp. perforatum L.	Millepertuis aux mille trous	St. John's Wort, Perforate
Jasione laevis Lam.	Jasione pérenne	Sheepsbit, Perennial
Juncus articulatus L.	Jonc articulé	Rush, Jointed
Knautia arvernensis (Briq.) Szabó	Knautie d'Auvergne	Scabious, of Auvergne
Lathyrus pratensis L.	Gesse des prés	Vetchling, Meadow
Linaria repens (L.) Mill.	Linaire rayée	Toadflax, Pale
Lotus pedunculatus Cav.	Lotier pédonculé	Bird's-foot trefoil, Greater
Malva moschata L.	Mauve musquée	Mallow, Musk
Meum athamanticum Jacq.	Fenouil des Alpes	Spignel, Baldmoney
Nardus stricta L.	Nard raide	Mat-grass
Phleum nodosum L.	Fléole bulbeuse	Cat's-tail, Smaller Meadow
Phleum pratense L.	Fléole des prés	Timothy
Pilosella officinarum Vaill.	Epervière piloselle	Hawkweed, Mouse-ear

Chemin Baraque du Pompeyrenc /cont.		
LatinTaxRef	Francais	English
Ranunculus flammula L.	Renoncule flammette	Spearwort, Lesser
Rubus idaeus L.	Framboisier	Raspberry
Salix caprea L.	Saule marsault	Willow, Goat, Great Sallow
Sanguisorba officinalis L.	Pimprenelle, Grande	Burnet, Great
Senecio sylvaticus L.	Séneçon des bois	Groundsel, Wood
Spergula morisonii Boreau	Spargoute printannière	Spurrey, Morison's
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl	Spergulaire rouge	Spurrey, Sand
Vicia angustifolia L.	Vesce à feuilles étroites (gousses noir)	Vetch, Narrow-leaved
Vicia cracca L.	Vesce à épis	Vetch, Tufted
Viola lutea Huds.	Violette des Vosges	Pansy, Mountain
Viola tricolor subsp. tricolor L.	Pensée sauvage	Pansy, Wild, Heartease
Le Chapeauroux et son ripisylve		
LatinTaxRef	Francais	English
Betula pubescens Ehrh.	Bouleau blanc	Birch, Downy
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch	Callitriche en crochet	Starwort, Intermediate
Chrysosplenium oppositifolium L.	Dorine à feuilles opposées	Saxifrage, Opposite-leaved Golden
Comarum palustre L.	Comaret	Cinquefoil, Marsh
Daphne mezereum L.	Daphné bois-gentil	Mezereon
Doronicum austriacum Jacq.	Doronic d'Autriche (m.)	Leopard's Bane, Austrian
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Reine-des-prés	Meadow-sweet
Glyceria notata Chevall.	Glycérie plissée	Sweet-grass, Plicate
Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr.	Laitue de Plumier	Blue-Sow-Thistle, Hailless
Lotus pedunculatus Cav.	Lotier pédonculé	Bird's-foot trefoil, Greater
Polygonatum verticillatum (L.) All.	Sceau-de-Salomon verticillé	Solomon's-seal, Whorled
Populus tremula L.	Tremble	Aspen
Ranunculus aconitifolius L.	Renoncule à feuilles d'aconit	Buttercup, White
Ribes petraeum Wulfen	Groseillier des rochers	Currant, Rock Red
Rosa pendulina L.	Rosier des Alpes	Rose, Alpine
Salix aurita L.	Saule à oreillettes	Willow, Round-leaved
Salix pentandra L.	Saule à cinq étamines	Willow, Bay
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia	Sorbier des oiseleurs	Rowan
Valeriana officinalis groupe (forme sambucifolia)	Valériane à petites feuilles	Valerian, Common
Veratrum album L.	Vératre blanche	White False Helleborine