


Sortie Ferrières 08-05-2025

La Can de Ferrières, près de Florac 950—1030 m

GPS: 44.26880 3.,62596 à 950 m

Compte Rendu Barmy Botanists

**Assistants :** Jean Claude Saint Leger, Valentine Aumont, Catherine Pernel, Raymond Gras, Anne-Marie Lemonnier, David & Mary Dickenson, Christiane Duchamp, Marc Boboeuf, Lydie Datry, Alan & Elspeth Cranston, Mattias & Beate Fiedler, Sophie Lemonnier, Geraldine Coste, Marie-Felice Villette



**La liste des plantes se trouve à la fin du compte rendu**

#### HABITATS PRINCIPALS EXPLORÉS :

Correspondance avec les codes sur EUNIS sur [https://inpn.mnhn.fr/docs/ref\\_habitats/EUNIS\\_Correspondances.pdf](https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf)

Codes Corines :

34.3263 Prairies semi-sèches à brome érigé des Causses

82.3 Cultures sur sol calcaire sec

David Dickenson [david@naturescene.co.uk](mailto:david@naturescene.co.uk)

En avril 2025, la floraison printanière était très précoce, puis la nature a repris ses droits et toute croissance s'est arrêtée pour 2-3 semaines. Donc quand les Barmies ont pris leur première sortie, tous étaient dans un état normal pour le début mai.

On a choisi un endroit peu connu, **la can de Ferrières**. Une can (parfois s'écrit **un can** ou **un cham**) s'agit d'un petit plateau calcaire, plus petite qu'un causse. Au sud de Florac se trouvent la Can de Tardonnenche, la Can de Ferrière, et la plus méridionale, la plus grande, la plus prospectée, la Can de l'Hospitalet. Et n'oublions pas les voisines les plus petites, la Can de St Laurent de Trèves et La Can des Combes.



La Can de Ferrières, avec le Causse Méjean au fond

Avec une géologie et une végétation liée au Causse Méjean au nord-ouest, visible toute la journée, les cans sont bien décrits par Marc Lemonnier, le mari de notre Barmie Sophie. On peut trouver les articles sur <https://www.reveeveille.net/candelhospitalet/les-cans/>.

L'intérêt principal pour nous en printemps était autour une arène d'un vert vif au centre, **un parcours des vaches en été** mais très solitaire début mai. Pour le retour sur la route, on se trouvait entouré d'une vaste étendue d'un terrain récemment défriché, avec les premières pousses des céréales. Les messicoles d'autrefois ont débutées leur réapparition.



En 1944, la Can de Ferrières faisait un terrain de parachutage d'armes pour la résistance. Est-ce que les vaches les attendent toujours ? (Photo de 2004).

Au début, le sentier passe sur un terrain vague utilisé variablement comme prairie, friche, culture, stockage de bois ..... On trouvait beaucoup des premières adventices printanières. Profitant de l'herbage courte début saison, ces adventices se trouvaient sur tous les habitats variés aujourd'hui, et oui, sans doute dans vos jardins.

Les premières fleurs du **lamier pourpre** (*Lamium purpureum*) se trouvaient partout dès janvier. Toute petite et avec une couronne des fleurs, à ne pas confondre avec le **lamier à feuilles panachées** (*Lamium maculatum*), beaucoup plus majestueux (et plus tardif) qu'on a trouvé plus tard dans les zones boisées autour le hameau de Ferrières.



Le lamier pourpre  
*Lamium purpureum*

Le lamier à feuilles panachées  
*Lamium maculatum*



**La drave printanière** (*Draba verna*) est également très précoce et se trouvait toute la journée. Tolérant du sel, c'est les petites étoiles blanches qu'on voit février/mars au bord des routes et des trottoirs. Le genre des draves a des silicules typiques.

Deux semaines auparavant, l'auteur a trouvé sur le plateau son cousin plus rare, **la drave des murs** (*Draba muralis*). Elle se distinguait par une hampe florale plus haute, avec les feuilles caulinaires embrassant la tige par 2 oreillettes arrondies (au lieu d'une tige florale nue). Dépit son hauteur, et la pointe GPS noté par l'auteur, on ne peut pas la retrouver ; zut ! La végétation l'a déjà cachée. Mais j'ajoute la photo quand même !



La drave printanière  
*Draba verna*



La drave des murs  
*Draba muralis*

Les silicules en cœur de la **bourse-à-pasteur**, du même hauteur que *Draba muralis*, confirment un genre différent, **Capsella bursa-pastoris**



La bourse-à-pasteur  
*Capsella bursa-pastoris*

Le plateau était tellement beau, dominé par une cuvette d'un pâturage vert vif, entouré d'une prairie classique. Sur les causses, ces bassins s'appellent '**dolines**'.

Plus ou moins circulaires, mesurant de quelques mètres à dizaines, voir centaines, des mètres, elles contiennent les sols riches descendus des prairies, une argile rouge (***terra rossa***). Prisées par les agriculteurs cévenols, pour leur fertilité et leur rétention d'eau, elles sont souvent utilisées pour les cultures.

Cette doline aujourd'hui a une longueur assez importante de 300m. C'est fauché en printemps, et parfois pâturé par les vaches en été.



La doline sur la can



L'orchis mâle  
*Orchis mascula*

Les orchidées sont les spécialistes des prairies, et on a trouvé en train d'éblouir pas mal d'orchis mâle (*Orchis mascula*), orchis pourpe (*Orchis purpurea*), orchis militaire (*Orchis militaris*), orchis singe (*Orchis simia*), orchis bouffon (*Anacamptis morio* subsp. *morio*), orchis sureau (*Dactylorhiza sambucina*) et la platanthère verdâtre (*Plantanthera chlorantha*). Il a fallu attendre fin journée pour voir les Ophrys.



L'orchis pourpe  
*Orchis purpurea*



L'orchis militaire hybride  
*Orchis militaris x purpurea*



L'orchis singe  
*Orchis simia*



L'orchis bouffon  
*Anacamptis morio* subsp. *morio*



L'orchis sureau  
*Dactylorhiza sambucina*



La platanthère verdâtre  
*Plantanthera chlorantha*

Le céraiste omniprésent s'agissait du **céraiste aggloméré** (***Cerastium glomeratum***). C'est le premier du printemps.

De taille variable, les fleurs sont agglomérées en cyme serrée, et les sépales sont couverts de poils glanduleux, même à leur sommet.

**Le céraiste aggloméré**  
***Cerastium glomeratum***



L'une des fleurs la plus jolie annonce le printemps, mais elle se trouve très rarement dans les comptes rendus.

En Angleterre, on dit que le printemps ne s'est pas débuté si on ne peut pas écraser sous le pied au moins 5 fleurs de la **pâquerette vivace** (***Bellis perennis***).

J'ajoute une photo en hommage à cette petite merveille.

**La pâquerette vivace**  
***Bellis perennis***

La **saxifrage granulée** (***Saxifraga granulata***) bénéficie des granules sur les racines pour stocker les nutriments pour une croissance rapide en printemps.

La tête florale se monte bien au-delà les herbes qui l'entourne.

**La saxifrage granulée**  
***Saxifraga granulata***



En hiver, pour s'amuser, l'auteur a fait une clé pour les véroniques de Lozère, et avait hâte pour la tester.

On a trouvé 6 espèces différentes aujourd'hui. La **véronique des champs** (*Veronica arvensis*), la **véronique petit-chêne** (*Veronica chamaedrys*), la **véronique à feuilles de lierre** (*Veronica hederifolia*), la **véronique de Perse** (*Veronica persica*), la **véronique à feuilles de serpolet** (*Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*), et le début de la **véronique d'Orsini** (*Veronica teucrium*).

Pour les différencier, le lecteur peut télécharger la fiche PDF sur [http://www.naturescene.net/barmies/formation\\_Veronica.pdf](http://www.naturescene.net/barmies/formation_Veronica.pdf). Ça marche !



La véronique des champs  
*Veronica arvensis*



La véronique petit-chêne  
*Veronica chamaedrys*



La véronique à feuilles de lierre  
*Veronica hederifolia*



La véronique de Perse  
*Veronica persica*



La véronique à feuilles de serpolet  
*Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*



La véronique d'Orsini  
*Veronica teucrium*

Plutôt aux bords de ce pâturage, dans les cavités un peu protégées du vent, on a vu **la primevère officinale** (*Primula veris* var. *veris*).

Plus courant sur le calcaire que le primevère à grandes fleurs (*Primula vulgaris*), il se distingue de loin par ces fleurs plus foncées et unilatérales, assez nombreuses sur une hampe bien dressée.

S'il y a un doute hors floraison, les feuilles sont brusquement contractées en pétiole.

**La primevère officinale**  
*Primula veris* var. *veris*



Dans le même milieu on a trouvé quelques **bugles de Genève** (*Ajuga genevensis*).

On avait du mal au début de les identifier, parce qu'elles avaient les fleurs très pales, pas de tout le beau bleu vif normal. Mais les bractées trilobées laissaient peu de doute.

**La bugle de Genève**  
*Ajuga genevensis*

On est descendu jusqu'aux environs du hameau de Ferrières pour prendre notre pique-nique.

**Le hameau de Ferrières**  
côté nord de la can



La première rencontre du printemps :  
Marie-Pierre a passé du temps pour  
mémoriser les moments ensemble.

**Geraldine et Sophie**



**Christiane et Marc**



**Mary et David**



**Jean Claude**

Pour le retour, on est resté sur la petite route, avec une densité de circulation d'une voiture chaque heure. Du temps pour admirer le paysage. On était sur les hauteurs avec les belles vues tout autour, surtout le plateau du Causse Méjean au fond.

Depuis longtemps, les deux côtés étaient des buissons un peu impénétrables, mais récemment on l'a défriché à grande échelle, et on a semé les céréales. Malheureusement, pour rendre cet investissement rentable, on a utilisé les herbicides avec ferveur et il y avait presque aucune adventice à voir.

Sauf, sauf, sur les bords. En automne, l'auteur a vu pas mal des messicoles sur une marge assez large. Malheureusement, aujourd'hui des autres adventices plus vigoureux ont caché les plantes messicoles. **Le mouron des oiseaux (*Stellaria media*)** surtout était abondant. Il faisait une belle ensemble avec **la mâche (*Valerianella locusta*)** sur une ligne des menhirs.



La mâche (en haut) et la mouron des oiseaux  
*Stellaria media* et *Valerianella locusta*



La rubéole  
*Sheradia arvensis*

En plus, des autres annuelles des champs et des zones vagues, comme la rubéole (*Sheradia arvensis*) et la pensée des champs (*Viola arvensis*).



La pensée des champs  
*Viola arvensis*

En automne, on peut mieux trouver les messicoles, surtout le bleuet (*Cyanus segetum*), qui a dû rester dormant depuis les dizaines des années.

Le bleuet  
*Cyanus segetum*  
(photo automne 2024)





La route vers le parking, partagée avec la GR43, était bordée par les menhirs

On a retrouvé le parking, mais la journée n'était pas finie. En retournant vers le Col de Rey, on a arrêté à l'endroit où on a fait les recherches paléontologiques l'année précédente. Sur un rocher d'un terrain récemment défriché, Marc Lemonnier a trouvé 2 empreintes des dinosaures. Un an plus tard, les excavations ont trouvé plus de 80 empreintes.




Les empreintes des dinosaures, après l'équipe des paléontologistes ont remis le terrain en l'état original en 2024.



Mais c'est que les vieux rochers. On a voulu voir s'il y avait des choses d'intérêt botanique après on a remis la terre.

À notre plaisir, on est tombé sur un site riche en orchidées, surtout les *Ophrys*. Parmi eux, il y avait les beaux groupes de l'**ophrys mouche** (*Ophrys insectifera*), une espèce assez rare, largement remplacé localement par l'endémique *Ophrys aymoninii*. En plus, l'**ophrys araignée** (*Ophrys aranifera* subsp. *aranifera*) et l'**ophrys bécasse** (*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax*).



L'ophrys mouche  
*Ophrys insectifera*



L'ophrys araignée  
*Ophrys aranifera* subsp. *aranifera*



L'ophrys bécasse  
*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax*

Deux semaines plus tard, l'auteur a retourné à cet endroit et il l'a trouvé riche en espèces peu courantes, y inclus la **fumeterre à petites fleurs** (*Fumaria parviflora*). Mais c'est une autre histoire .....

La fumeterre à petites fleurs  
*Fumaria parviflora*



| LatinTaxRef                                                                        | Francais                      | English                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Acer campestre L.                                                                  | Érable champêtre              | Maple, Field              |
| <i>Ajuga genevensis</i> L.                                                         | Bugle de Genève               | Bugle, Blue, Geneva Bugle |
| Allium vineale L.                                                                  | Ail des vignes                | Garlic, Crow              |
| Alyssum alyssoides (L.) L.                                                         | Alysson faux-alysson          | Alison, Small             |
| <i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Orchis bouffon                | Orchid, Green-winged      |
| Anisantha sterilis (L.) Nevski                                                     | Brome stérile                 | Brome, Barren             |
| Anthoxanthum odoratum L.                                                           | Flouve odorante               | Sweet vernal grass        |
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>                         | Cerfeuil des bois             | Cow Parsley               |
| Arabis hirsuta (L.) Scop.                                                          | Arabette hérissée             | Rock-cress, Hairy         |
| Astragalus monspessulanus L. subsp. <i>monspessulanus</i>                          | Astragale de Montpellier (m.) | Milk-Vetch, Montpellier   |
| <i>Bellis perennis</i> L.                                                          | Pâquerette vivace             | Daisy                     |
| Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.                                                    | Brome érigé                   | Brome, Upright            |
| Bromus hordeaceus L. subsp. <i>hordeaceus</i>                                      | Brome fausse orge             | Brome, Common Soft        |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.                                                | Bourse-à-pasteur              | Shepherd's Purse          |
| Carex flacca subsp. <i>flacca</i> Schreb.                                          | Laîche glauque                | Sedge, Glaucous           |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.                                                | Céraiste aggloméré            | Mouse-ear, Sticky         |
| Cornus mas L.                                                                      | Cornouiller male              | Cornelian cherry          |
| Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss. <b>À confirmer</b>                              | Anthémis des teinturiers      | Chamomile, Golden         |
| Crataegus monogyna Jacq.                                                           | Aubépine                      | Hawthorn, Single-styled   |
| Crepis sancta (L.) Bornm.                                                          | Crépis de Nîmes               | Hawk's-beard, [Nimes]     |
| Cruciata laevipes Opiz                                                             | Gaillet croisetie             | Crosswort                 |
| Cyanus segetum Hill                                                                | Bleuet                        | Cornflower                |
| Dactylis glomerata L. subsp. <i>glomerata</i>                                      | Dactyle peletonné             | Cock's-foot               |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó                                             | Orchis sureau                 | Orchid, Elder-flowered    |
| Daphne laureola L.                                                                 | Lauréole                      | Spurge laurel             |
| <i>Draba verna</i> L.                                                              | Drave printanière             | Whitflow Grass, Spring    |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. <i>cutarium</i>                              | Bec-de-grue                   | Storksbill                |
| Geranium columbinum L.                                                             | Géranium colombin             | Cranesbill, Long-stalked  |
| Geranium lucidum L.                                                                | Géranium luisant              | Cranesbill, Shining       |
| Geranium pyrenaicum Burm.f.                                                        | Géranium des Pyrénées         | Cranesbill, Hedgerow      |
| Geranium rotundifolium L.                                                          | Géranium à feuilles rondes    | Cranesbill, Round-leaved  |
| Helianthemum oelandicum var. <i>canescens</i> (Hartm.)                             | Hélianthème des montagnes     | Rock-Rose, (Mountain)     |
| Hepatica nobilis Schreb.                                                           | Hépatie trilobée              | Hepatica                  |
| Hieracium planchonianum Timb.-Lagr. & Loret                                        | Épervière (de Planchon)       | Hawkweed, (of Planchon)   |
| Hordeum vulgare subsp. <i>vulgare</i> L.                                           | Orge à six (quatre) rangs     | Barley, Winter            |
| <i>Lamium maculatum</i> (L.) L.                                                    | Lamier à feuilles panachées   | Dead-nettle, Spotted      |
| <i>Lamium purpureum</i> L.                                                         | Lamier pourpre                | Dead-nettle, Red          |
| Lepidium campestre (L.) R.Br.                                                      | Passerage (f.) des champs     | Pepperwort, Field         |
| Lithospermum officinale L.                                                         | Grémil, Herbe aux perles      | Gromwell                  |
| Luzula campestris (L.) DC.                                                         | Luzule des champs             | Woodrush, Field           |
| Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. <i>sylvatica</i>                            | Luzule des bois               | Woodrush, Greater         |
| Lysimachia arvensis subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.                  | Mouron des champs             | Scarlet Pimpernel         |

|                                                                              |                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Mercurialis perennis</i> L.                                               | Mercuriale des bois         | Mercury, Dogs             |
| <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.                                       | Muscari en grappe           | Grape hyacinth, Southern  |
| <i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>teresiana</i> (Sennen) Grau              | Myosotis des bois           | Forget-me-not, Wood       |
| <i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>ramosissima</i> Rochel                 | Myosotis très rameux        | Forget-me-not, Early      |
| <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase              | Orchis brûlé                | Orchid, Burnt             |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.                                           | Sainfoin                    | Sainfoin                  |
| <i>Ophrys aranifera</i> subsp. <i>aranifera</i> Huds.                        | Ophrys araignée             | Orchid, Early Spider      |
| <i>Ophrys insectifera</i> L.                                                 | Ophrys mouche               | Orchid, Fly               |
| <i>Ophrys scolopax</i> subsp. <i>scolopax</i> Cav.                           | Ophrys bécasse              | Orchid, Woodcock          |
| <i>Orchis mascula</i> (L.) L.                                                | Orchis mâle                 | Orchid, Early Purple      |
| <i>Orchis militaris</i> L.                                                   | Orchis militaire            | Orchid, Military          |
| <i>Orchis purpurea</i> Huds.                                                 | Orchis pourpe               | Orchid, Lady              |
| <i>Orchis simia</i> Lam.                                                     | Orchis singe                | Orchid, Monkey            |
| <i>Ornithogalum umbellatum</i> L.                                            | Ornithogale                 | Star-of-Bethlehem         |
| <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Ce-              | Panais brûlant              | Parsnip, Wild             |
| <i>Pisum sativum</i> subsp. <i>biflorum</i> (Raf.) Soldano                   | Pois élevé                  | Pea, [Wild]               |
| <i>Plantago lanceolata</i> L.                                                | Herbe à cinq cotes          | Plantain, Ribwort         |
| <i>Plantago media</i> L.                                                     | Plantain, Moyen             | Plantain, Hoary           |
| <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.                                 | Platanthère (f.) verdâtre   | Orchid, Greater Butterfly |
| <i>Poa annua</i> L.                                                          | Pâturin                     | Meadow-grass, Annual      |
| <i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler                               | Pâturin bulbeux             | Meadow-grass, Bulbous     |
| <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L.                              | Pâturin des prés            | Meadow-grass, Smooth-     |
| <i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i> L.                              | Paturin commun              | Meadow-grass, Rough-      |
| <i>Potentilla verna</i> L.                                                   | Potentille printanière      | Cinquefoil, Spring        |
| <i>Poterium sanguisorba</i> L.                                               | Pimprenelle Petite          | Burnet, Salad/Fodder      |
| <i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L.                                    | Primevère officinale        | Cowslip                   |
| <i>Prunus spinosa</i> var. <i>spinosa</i> L.                                 | Prunellier                  | Blackthorn                |
| <i>Pulsatilla rubra</i> var. <i>serotina</i> (H.J.Coste) Aichele & Schwegler | Pulsatille rouge tardive    | Pasque flower             |
| <i>Rabelera holostea</i> (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp                       | Stellaire holostée          | Stitchwort, Greater       |
| <i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>                               | Bouton d'or                 | Buttercup, Meadow         |
| <i>Ranunculus auricomus</i> L.                                               | Renoncule tête-d'or         | Buttercup, Goldilocks     |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L.                                                | Renoncule bulbeuse          | Buttercup, Bulbous        |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>                   | Ravenelle                   | Radish, Wild              |
| <i>Saxifraga granulata</i> L.                                                | Saxifrage granulée          | Saxifrage, Meadow         |
| <i>Saxifraga tridactylites</i> L.                                            | Saxifrage à trois doigts    | Saxifrage, Rue-leaved     |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>pecten-veneris</i>                | Peigne-de-Vénus             | Shepherd's Needle         |
| <i>Sherardia arvensis</i> L.                                                 | Rubéole                     | Field Madder              |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.                                      | Herbe aux chèvres           | Hedge Mustard             |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.                                            | Mouron des oiseaux          | Chickweed                 |
| <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser                              | Pissenlit à feuilles lisses | Dandelion, Lesser         |
| <i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>                                      | Pissenlit                   | Dandelion, Common         |
| <i>Teucrium rouyanum</i> H.J.Coste & Soulié                                  | Germandrée de Rouy          | Germander of the Causse   |
| <i>Thymus vulgaris</i> L.                                                    | Thym                        | Thyme                     |
| <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.             | Barbe-de-bouc               | Goat's-Beard              |

|                                                                           |                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) Ser. | Trèfle incarnat sauvage          | Clover, Long-headed                   |
| <i>Trifolium nigrescens</i> Viv.                                          | Trèfle noircissant               | Clover, Small White                   |
| <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.                                         | Trinia glauque                   | Honeywort                             |
| <i>Urtica dioica</i> L.                                                   | Grande ortie                     | Nettle                                |
| <i>Valeriana tuberosa</i> L.                                              | Valeriane tubéreuse              | Valerian, Tuberous                    |
| <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.                                     | Mâche                            | Lamb's Lettuce                        |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.                                  | Mâche                            | Lamb's Lettuce                        |
| <i>Veronica arvensis</i> L.                                               | Véronique des champs             | Speedwell, Wall                       |
| <i>Veronica chamaedrys</i> L.                                             | Véronique petit-chêne            | Speedwell, Germander                  |
| <i>Veronica hederifolia</i> L.                                            | Véronique à feuilles de lierre   | Speedwell, Ivy-leaved                 |
| <i>Veronica persica</i> Poir.                                             | Véronique de Perse               | Speedwell, Field, Buxbaum's Speedwell |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L.              | Véronique à feuilles de serpolet | Speedwell, Thyme-leaved               |
| <i>Veronica teucrium</i> L.                                               | Véronique d'Orsini               | Speedwell, Orsini's                   |
| <i>Viola arvensis</i>                                                     | Pensée des champs                | Field Pansy                           |
| <i>Viola riviniana</i> Rchb.                                              | Violette de Rivin                | Violet, Common dog                    |