


Sortie Lou Devez 08/06/2025

Ancien pâturage du Causse Sauveterre. 970 m

GPS: 44.43712 3,47795 à 970 m 47795

Compte Rendu Barmy Botanists

Assistants : Jean Claude Saintleger, David & Mary Dickenson, Mattias & Beatte Fiedler, Marie-Pierre Tuffery, Catherine Pernel, Raymond Gras



La liste des plantes se trouve à la fin du compte rendu

HABITATS PRINCIPALS EXPLORÉS :

Correspondance avec les codes sur EUNIS sur https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf

Codes Corines :

34.3263 Prairies semi-sèches à brome érigé des Causses

34.7111 Pelouse d'allure steppique à stipe penné des Causses

Le Causse Sauveterre est bien moins connu, moins prospecté, que Le Causse Méjean. Les Barmies ont prospecté le terrain pas loin du hameau de Sauveterre en mi-été l'année dernière, et ils ont choisi un terrain ce printemps plus à l'est, jusqu'à la limite du Parc national des Cévennes.

« **Lou Devez** » est un nom occitan, qui historiquement a voulu dire un terrain dont le pâturage est interdit ou réglementé pendant une certaine période pour permettre à l'herbe de repousser.

De nos jours, c'est un terrain plutôt abandonné à la nature. L'auteur pense qu'il a vu peut-être un troupeau de brebis très transitoire une/deux fois en 20 ans, mais en été l'herbe est en un état très triste. Un demi-kilomètre plus au sud, il y a un troupeau des vaches toute l'été sur un sol pas trop différent, mais il ne faut pas s'inquiéter qu'elles deviennent trop grasses. Le sol calcaire n'est pas très épais, les pluies d'été sont rares, et il n'y a aucuns ruisselets d'eau. D'ici 3 semaines, la végétation est cramée.



La verdure aujourd'hui 08 juin 2025

Doline au fond



Trois semaines plus tard 27 juin 2025

Même endroit : végétation cramée, doline fauchée

Mais aujourd'hui, c'est un beau vert, avec une abondance des espèces alléchantes pour attirer les Barmies.



Le genêt d'Espagne (*Genista hispanica* subsp. *hispanica*)

Un peu partout, la pelouse était parsemée avec les fleurs jaunes du **genêt d'Espagne** (*Genista hispanica* subsp. *hispanica*).

Les jeunes rameaux étaient doux sous les pieds, mais 3 semaines plus tard notre chien a refusé de nous accompagner, tant les épines sont devenues vulnérantes.



Les épines, 3 semaines plus tard

Les fleurs jaunes étaient l'ordre du jour. La **coronille minime** (*Coronilla minima* subsp. *minima*) était courante, facile d'identifier avec ses petites feuilles glauques. Plus difficile, parce que c'était déjà la fin de floraison, la **vulnéraire** (*Anthyllis vulneraria* subsp. *vulneraria*) ça et là. En murissants, les calices sont devenus de plus en plus poilus ; d'un blanc pur, manquant le rouge qu'on voit la plupart de temps.



Une petite herbe blanche a attiré notre attention ; on l'a vu un peu partout toute la journée. Il s'agit d'un thésium, mais laquelle ?

La grappe fructifère n'était pas en zigzag, donc on pouvait vite écarter *Thesium pyrenaicum*, ce qui est plutôt une espèce d'Aubrac. Le *Thesium alpinum* a des fleurs à 4, parfois 5, pétales, et la première plante qu'on a examinée était exactement comme ça.

Le thésium divariqué (*Thesium humifusum* subsp. *divaricatum*)



Mais c'était trompeuse. Toutes les autres plantes étaient exclusivement 5-pétalées. En plus, les inflorescences étaient en pyramide large, pas en grappe simple et étroite.

Donc, il s'agit du **thésium divariqué** (*Thesium humifusum* subsp. *divaricatum*), qui adore les pelouses basiphiles xérophiles (calcaire, sol sec) ; parfait !




Mais on n'a pas fini avec les petites fleurs blanches. Dans les zones les plus rocailleux, on a vu **le lin à feuilles de salsola (*Linum appressum*)**. À leur base, les pétales sont striés de rouge, le plus évidente en bouton.

**Le lin à feuilles de salsola
(*Linum appressum*)**

Beaucoup plus rarement, on a trouvé un lin annuel, bien plus petit, avec la caractéristique des pédicelles souvent longuement penchées, le **lin purgatif (*Linum catharticum*)**.

**Le lin purgatif
(*Linum catharticum*)**



**Le cheveu d'ange
(*Stipa gallica*)**

**La koelérie de Vallais
(*Koeleria vallesiana*)**

**Le brome érigé
(*Bromopsis erecta*)**

La pelouse était dominée par un mélange égal du **cheveu d'ange (*Stipa gallica*)** (indice des sols secs, profondeur de 1-3 cm) et le **brome érigé (*Bromopsis erecta*)** (sols semi-secs, profondeur de 4-10 cms).



**Le brome érigé
(*Bromopsis erecta*)**



**Le koelérie de Vallais
(*Koeleria vallesiana* subsp. *vallesiana*).**

Mais il y avait des autres graminées comme invitées ; parmi eux, pas mal de **koelérie de Vallais (*Koeleria vallesiana* subsp. *vallesiana*)**.



Classique des coteaux secs et rocaillieux des causses, la souche est renflée en bulbe à réseau des fibres (les gaines des anciennes feuilles entrecroisées en réseau filamenteux), qui la distingue de *Koeleria pyramidata*.

Si on est trop paresseux de se mettre à genou pour l'examiner, la panicule est plus courte en plus.



L'euphorbe de Seguiér
(*Euphorbia seguieriana* var. *seguieriana*)

L'euphorbe de Seguiér (*Euphorbia seguieriana* var. *seguieriana*), courante sur le Causse Méjean, était largement remplacée par une espèce plus rare, l'euphorbe de Duval (*Euphorbia duvalii*).



L'euphorbe de Duval
(*Euphorbia duvalii*)

L'euphorbe de Duval est facile à l'identifier par les feuilles et bractées un peu bleuâtres et surtout par ses tiges et marges des bractées un rouge-brunâtre.

Les bractées libres, les glandes entières et les tubercules déjà bien développés sur les fruits ont servi à convaincre les sceptiques.



On s'était émerveillé par une abondance de deux espèces à inflorescences blanches, toutes les deux aux pédoncules fiers au-dessus des autres herbes.

La première était la **phalangère à fleurs de lis** (*Anthericum liliago*), normalement trouvée sur les versants rocaillieux.

C'était remplacé 2 semaines plus tard par sa sœur, *Anthericum ramosum*, mais la plupart des Barmies les ont ratés.



La phalangère à fleurs de lis
(*Anthericum liliago*)



L'autre favorite était la **spirée filipendule** (*Filipendula vulgaris*); l'inflorescence ressemble *Filipendula ulmaria*, une plante des pâturages humides, mais les feuilles sont tellement différentes. Les Barmies l'en ont vu la prochaine sortie, à la Vernède.

La spirée filipendule
(*Filipendula vulgaris*)



La lavande
(*Lavandula angustifolia* subsp. *angustifolia*)
 (photos 6 semaines plus tard)



La lavande (*Lavandula angustifolia* subsp. *angustifolia*) était en bouton. Donc il a fallu revenir 6 semaines plus tard pour des photos fin juillet.


C'est la seule plante de mon jardin que l'auteur n'arrose jamais. Quelques Mendois font les récoltes ici chaque année, tentés par l'abondance et son parfum intense.

La genotte (*Conopodium majus*) des terrains schisteux et granitique est remplacée par le **bunium noix-de-terre (*Bunium bulbocastanum*)**.

Au lieu d'une « noix » noire sur la racine on trouve une noix brune. Ou plutôt, Jean-Claude a trouvé la noix brune ; l'auteur n'a jamais réussi désenterrer ni les noix noires ni les noix brunes.



Le bunium noix-de-terre
(*Bunium bulbocastanum*)



On est tombé sur une petite plante cachée, qu'on pense est assez rare, noté qu'une fois sur la Causse Sauveterre, **la crupine commune (*Crupina vulgaris*)**.

On la voit parfois sur les sols pierreux ; peut-être c'est plus courant, mais elle se cache, et fait la difficile à voir dans une herbe assez dense.

La crupine commune
(*Crupina vulgaris*)



Le myosotis des champs
(*Myosotis arvensis*)

Il y avait une petite doline présente, d'une taille suffisamment grande pour cultiver soit un peu de céréale, soit (de nos jours) de fourrage.

Autour, on a identifié une boraginacée très banale, le **myosotis des champs** (*Myosotis arvensis*). Pressé pour faire les fruits avant que la culture puisse le dominer, on l'a distingué par ses longs pédicelles.

À la marge de la doline, un buisson **la langue-de-chien** (*Cynoglossum officinale*), peu courante. Avec sa grappe courbée typique de la même famille des myosotis, les Boraginacées, ses particularités sont les fleurs d'un rouge vineux, et un parfum d'une souris.

Inoubliable !

La langue-de-chien
(*Cynoglossum officinale*)



Jusqu'à côté, une station de **petit pigamon** (*Thalictrum minus* subsp. *saxatile*), faisant une contraste forte avec sa forme délicate. Dommage, c'était toujours en bouton.



Le petit pigamon
(*Thalictrum minus* subsp. *saxatile*)



Une fleur, plus joli 3 semaines plus tard, quand les
elles s'éclatent (photo de Florac)



La marguerite
(*Leucanthemum ircutianum*)

Toujours aux marges de cette doline, quelques **marguerites** (*Leucanthemum ircutianum*). C'est très peu noté localement, mais probablement parce que les gens ne l'ont pas différencié de *Leucanthemum vulgare* (jusqu'à récemment, c'était une sous-espèce).

Visuellement, ils sont très proches ; c'est que la forme des feuilles qui fait la différence (plus larges au bout).

Mais pour l'agriculteur, c'est d'autre chose. *Leucanthemum ircutianum* forme une colonie rapidement avec rejets stériles. Si on a continué la route quelque kilomètres vers Mende, on a vu des cultures presque oblitérées par cette adventice (mais sous contrôle depuis 2 ans).

Les orchidées étaient assez rares, sauf Jean Claude nous a montré un endroit extraordinaire de que quelques mètres carrés, avec une douzaine d'espèces.



L'ophrys mouche des Causses
(*Ophrys aymoninii*)

Parmi les cinq espèces d'ophrys, **ophrys mouche des Causses** (*Ophrys aymoninii*) (endémique), et une rareté **l'ophrys de Pâques** (*Ophrys passionis*), avec sa belle robe pourpre, et les gibbosities presque absentes.

L'Ophrys de Pâques (*Ophrys passionis*)



2025 était l'année des **orobanches**. Ces plantes parasitiques et énigmatiques, sans feuilles, ressemblent les asperges, mais des couleurs disent « ne me mange pas ». On a vu trois espèces un peu partout, qui ont posé les vrais défis d'identification.

L'auteur trouve qu'une photo normale n'a aucune valeur. C'est impératif de photographier le stigmate pour sa couleur, les bractées et sépales pour leur forme, et la végétation parasitée autour. Et n'oubliez jamais de le sentir, pour vérifier l'odeur de girofle ou non. Le couleur de la plante peut être variable, et l'auteur trouve le critère de la base renflé ou non d'une valeur maigre.



L'orobanche du thym
(*Orobanche alba*)

Odeur de girofle, veines foncées, stigmates rougeâtre-brun

Parasite de *Thymus* et parfois d'autres Labiateae.



L'orobanche sanglante
(*Orobanche gracilis*)

Odeur de girofle, stigmates jaune, gorge rouge luisant

Parasite des Fabaceae.



L'orobanche de la germandrée
(*Orobanche teucrii*)

Odeur de girofle, stigmates rouge-brun

Parasite de *Teucrium*.



En traversant la prairie pour retrouver nos voitures, au moment qu'on a pensé qu'il n'y a rien d'autre à trouver, on est tombé sur une station importante du **plantain argenté** (*Plantago argentea*).

À cause de cette abondance, les reflets argentés des ses feuilles velus-soyeux étaient très visibles.

En Lozère, c'est une espèce peu notée. C'est probable que les botanistes se trompent pour *Plantago lanceolata*, très banal.

En effet, c'est ce que les Barmies ont fait toute la journée. Après, en faisant attention, on a réalisé que toutes les plantes individuelles sur quelques hectares qu'on a noté comme *Plantago lanceolata*, étaient en réalité *Plantago argentea*.



Le plantain argenté
(*Plantago argentea*)



L'auteur, avec sa femme Mary et Jean Claude Saintleger, ont refait quelques prospections pendant toute l'été 2025



Pâturage

LatinTaxRef	Francais	English
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	Yarrow
<i>Achillea odorata</i> L.	Achillée odorante	Yarrow, Fragrant
<i>Adonis vernalis</i> L.	Adonis de printemps	Adonis, Yellow
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Bugle de Genève	Bugle, Blue, Geneva Bugle
<i>Amelanchier ovalis</i>	Amelanchier	June Berry, Serviceberry
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	Orchid, Pyramid
Anthericum liliago L.	Phalangère à fleurs de lis	St. Bernard's Lily
<i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	Kidney Vetch, Mountain
Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria L.	Vulnéraire	Kidney Vetch
<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem	Alisier	Whitebeam
<i>Artemisia alba</i> Turra	Armoise blanche	Mugwort, White
<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	Spleenwort, Southern Rock
<i>Aster alpinus</i> L.	Aster des Causses des Cévennes	Aster, Alpine ssp Cevenol
<i>Astragalus monspessulanus</i> L. subsp. <i>monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier	Milk-Vetch, Montpellier
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	Brachypode des rochers	Tor-grass
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	Brome érigé	Brome, Upright
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Braun-Blanq.	Brome de Thomine-Desmazures	Brome, Sand Soft
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Bunium noix-de-terre	Pignut, Great
<i>Bupleurum baldense</i> Turra	Buplèvre du Mont Baldo	Hare's-Ear, Small
<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>acanthifolia</i>	Cardabelle	Acanthus thistle
<i>Carthamus mitissimus</i> L.	Cardoncelle molle	Thistle, Dwarf blue
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère de damas	Helleborine, White
Coronilla minima L. subsp. minima	Coronille minime	Scorpion vetch, [Dwarf]
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	Hawthorn, Single-styled
<i>Crepis albida</i> Vill.	Crépide blanchatre	Hawks-beard, Whitened
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisetie	Crosswort
Crupina vulgaris Cass.	Crupine commune	Saw-wort, False
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang	Cytise à feuilles sessiles	Broom, Sessile
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon roulant	Eryngo, Field
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	Spurge, Cypress
Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte	Euphorbe de Duval	Spurge, [Duval]
Euphorbia seguieriana var. seguieriana Neck.	Euphorbe de Seguiet	Spurge, Dwarf
Filipendula vulgaris Moench	Spirée filipendule	Dropwort
<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Gaillet à feuilles d'asperge sauvage	Bedstraw, (asparagus-
Genista hispanica L. subsp. hispanica	Genêt d'Espagne	Gorse, Spanish
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire ponctuée	Globularia
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	Rock-Rose, Apennine
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème commune	Rock-Rose, Common
<i>Helianthemum oelandicum</i> var. <i>canescens</i> (Hartm.) Fr.	Hélianthème des montagnes	Rock-Rose, (Mountain)
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	Orchid, Lizard
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fer-a-Cheval	Vetch, Horseshoe
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i> L.	Millepertuis aux mille trous	St. John's Wort, Perforate

<i>Inula montana</i> L.,	Inule des montagnes	Inula, Mountain
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	Juniper, Common
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	Scabious, Field
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin subsp. <i>vallesiana</i>	Koellerie de Vallais	Hair Grass, Somerset
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. subsp. <i>angustifolia</i>	Lavande	Lavender
<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam.	Marguerite à feuilles de graminée	Ox-eye daisy, Grass-leaved
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	Marguerite	Ox-eye daisy
<i>Linum appressum</i> Caball.	Lin à feuilles de salsola	Flax, White
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	Flax, Purgative
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Bird's-foot trefoil, Common
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis brûlé	Orchid, Burnt
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Nid-d'Oiseau	Orchid, Birds nest
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Grande Listère	Twayblade
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	Sainfoin
<i>Onosma tricerosperma</i> subsp. <i>fastigiata</i> (Braun-Blanq.) G.López	<i>Onosma</i> fausse-viperine	Golden Drop
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys</i> abeille	Orchid, Bee
<i>Ophrys aranifera</i> subsp. <i>aranifera</i> Huds.	<i>Ophrys</i> araignée	Orchid, Early Spider
<i>Ophrys aymoninii</i> (Breistr.) Buttl.	<i>Ophrys</i> mouche des Causses	Orchid, Early Fly
<i>Ophrys passionis</i> Sennen	<i>Ophrys</i> de pâques	Orchid, Passion
<i>Ophrys scolopax</i> subsp. <i>scolopax</i> Cav.	<i>Ophrys</i> bécasse	Orchid, Woodcock
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Homme pendu	Orchid, Man
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	Orchid, Early Purple
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	Orchid, Military
<i>Ornithogalum kochii</i> Parl.	Ornithogale à feuilles ténues	Star-of-Bethlehem, [Erect-
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	Orobanche du thym	Broomrape, Thyme
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	Orobanche sanglante (grêle)	Broomrape, Slender
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	Broomrape, (of Teucriums)
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot commun	Poppy, Corn
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet prolifère	Pink, Proliferous
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	Raiponce à têtes hémisphériques	Rampion, Globe-headed
<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	Pine, Austrian
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	Pine, Scots
<i>Plantago argentea</i> Chaix	Plantain argenté	Plantain, Silver
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Platanthère (f.) à deux feuilles	Orchid, Lesser Butterfly
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Platanthère (f.) verdâtre	Orchid, Greater Butterfly
<i>Podospermum purpureum</i> (L.) W.D.J.Koch & Ziz	Scorzonère pourpre	Vipersgrass, Purple
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	Polygale du calcaire	Milkwort, Chalk
<i>Potentilla verna</i> L.	Potentille printanière	Cinquefoil, Spring
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	Self-Heal, Cut-leaved
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier mahaleb	Cherry, St. Lucie's
<i>Pulsatilla rubra</i> var. <i>serotina</i> (H.J.Coste) Aichele & Schwegler	Pulsatille rouge tardive	Pasque flower
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Ranuncle graminioide	Buttercup, Grass-leaved

Rhinanthus minor L.	Cocriste	Yellow Rattle, Common
Ribes uva-crispa L.	Groseillier épineux	Gooseberry
Rosa villosa L.	Églantier velu	Rose, Downy
Salvia pratensis L.	Sauge des près	Meadow Clary
Saxifraga granulata L.	Saxifrage granulée	Saxifrage, Meadow
Saxifraga tridactylites L.	Saxifrage à trois doigts	Saxifrage, Rue-leaved
Scrophularia canina subsp. pinnatifida (Brot.) J.-M.Tison	Scrofulaire des chiens	Figwort, Dog
Sesleria caerulea (L.) Ard.	Seslérie bleue	Moor grass, Blue
Silene otites (L.) Wibel	Silène à petites fleurs	Catchfly, Spanish
Solanum dulcamara L.	Douce-amère	Nightshade, Woody
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia	Sorbier des oiseleurs	Rowan
Stipa gallica Celak.	Cheveu d'ange	Feather-grass
Teucrium chamaedrys L.	Chênnette	Germander, Wall
Thesium humifusum subsp. divaricatum (Jan ex Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens	Thésium divariqué	Bastard Toadflax, Branched
Tragopogon dubius Scop.	Salsifis douteux	Salsify, Yellow
Trifolium montanum L. subsp. montanum	Trèfle de montagne	Clover, Mountain
Trinia glauca (L.) Dumort.	Trinia glauque	Honeywort
Valeriana tuberosa L.	Valériane tubéreuse	Valerian, Tuberous
Verbascum thapsus subsp. thapsus L.	Bouillon blanc	Mullein, Aaron's Rod
Veronica chamaedrys L.	Véronique petit-chêne	Speedwell, Germander
Vicia onobrychioides L.	Vesce faux-sainfoin	False Sainfoin
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Dompte-venin officinal	Swallow-wort
Ziziphora acinos (L.) Melnikov	Thym basilic	Basil-thyme

Doline

LatinTaxRef	Francais	English
Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa	Centaurée scabieuse	Knapweed, Greater
Cynoglossum officinale L.	Langue-de-chien	Hound's Tongue
Legousia speculum-veneris subsp. speculum-veneris (L.) Chaix	Miroir de Vénus	Venus looking-glass, Large
Muscari comosum (L.) Mill.	Muscari à Toupet	Tassel Hyacinth
Myosotis arvensis	Myosotis des champs	Forget-me-not, Field
Plantago media L.	Plantain, Moyen	Plantain, Hoary
Reseda lutea L.	Réséda jaune, Mignonette	Mignonette, Wild
Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano	Rhinanthe du midi	Yellow Rattle, (Mediterranean)
Thalictrum minus subsp. saxatile Ces.	Pigamon, Petit	Meadow Rue, Lesser
Valerianella dentata (L.) Pollich	Mâche [dentée]	Corn-salad, Toothed
Vicia tenuifolia Roth	Vesce à folioles tenues	Vetch, Fine-leaved